

Interessant is het voorkomen van *Melasoma vigintipunctata* Scop. in de omstreken van Breda, welke soort tot nog toe slechts eenmaal bij Roermond, door den heer Latiers, werd aangetroffen. Ook werd *Carphoborus minimus* F. in het Mastbosch gevangen, van welke soort alleen de gangen in het Noorden van Drenthe en in het Speulderbosch bij Putten op de Veluwe, door Prof. Ritzema Bos, werden aangetroffen. Ook *Myelophilus minor* Hartig werd bij Rijsbergen, in de loten van den groven den en aan het bovineinde van een vangboom verzameld. Schr. was zoo vriendelijk mij van elk dezer drie soorten een exemplaar voor mijne verzameling af te staan ; vooral *Carphoborus* was mij bijzonder welkom, daar ik deze soort nog nimmer uit Nederland zag.

ED. EVERTS.

---

#### **Helophorus asperatus Rey.**

Deze soort, van welke een Nederlandsch exemplaar, bij Sluyskill nabij Ter Neuzen, werd gevangen en in het Brusselsch Museum van Nat. Hist. bewaard wordt, is een tweede, minder uitgekleurd exemplaar op het eilandje Schokland, door Dr. Nierstrasz, verzameld. De opvallende gedaante van het halschild bij deze soort belet echter niet, dat ik het niet onwaarschijnlijk acht, dat *asperatus* niet als soort, maar als een afwijkende vorm van *H. crenatus* Rey moet beschouwd worden. Ganglbauer (Die Käfer von Mitteleuropa, 4<sup>ter</sup> Band, 1<sup>te</sup> Hälfte, 1904 blz. 171) noemt *asperatus* Rey synoniem aan *crenatus* Rey. Dr. Nierstrasz was zoo vriendelijk dit exemplaar voor mijne collectie af te staan.

ED. EVERTS.

---