

**Entomologische aantekeningen.***Sarcopsylla*.

Door bemiddelling van Mr. Leesberg ontving ik van Notaris De Bas uit den Haag eene *Sarcopsylla*, die mij geheel onbekend was. Bij duizenden hadden deze vlooien de fazanten- en duivenhokken van Notaris de Bas geïnfecteerd. Niettegenstaande alle moeite, is het niet gelukt een ♂ te vinden.

Ik zond de *Sarcopsylla*'s in Nov. 1900 aan Dr. Taschenberg, den welbekenden psylloloog.

A. C. OUDEMANS.

*Notodonta bicoloria* W. V.

Een afgevlogen ♀ exemplaar van deze voor onze Fauna nieuwe soort werd door een mijner leerlingen, E. Berends bij Velp, onder een braamstruik op den grond fladderende aangetroffen, en wel op den 24sten Juni 1900.

A. C. OUDEMANS.

*Lophopteryx carmelita*. Esper.

Drie exemplaren, alle drie bijzonder fraai, werden van deze voor onze Fauna nieuwe soort door een jongmensch W. Kruitbosch, den 23sten April 1901 te Rosendaal bij Velp gevangen.

A. C. OUDEMANS.

*Acarus dimidiatus*. Herm.

Nog steeds bleef onzeker welke soort hiermede door Hermann bedoeld werd.

De teekening doet vermoeden, dat zijn ex. een sterk opgezwollen ♀ was. De heer H. Schütz te Rotterdam zond mij eenige Acari door hem in zijn terrarium gevonden. Daaronder bevond zich 1 ex. *Ararus dimidiatus*! En wie was 't? Niemand anders dan een sterk opgezwollen ♀ van den allergeewoonsten *Glycyphagus domesticus* de Geer.

A. C. OUDEMANS.

*Eremaeus novus*, nov. sp.

Eene nieuwe soort van *Eremaeus* vond ik te midden van andere Acari, door den heer H. Schütz te Rotterdam in zijn terrarium gevonden. *Eremaeus novus* wordt door mij beschreven in het *Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging*.

A. C. OUDEMANS.

---

*Caenonychus fallax*, nov. gen., nov. sp.

Dege aan *Tydeus* en *Eupodes* verwante *nova species* is eveneens een vondst van den heer H. Schütz te Rotterdam. Zelfs het genus is nieuw en onderscheidt zich door het bezit van 1<sup>o</sup> slechts één klauw, in plaats van 2, aan elken poot, en 2<sup>o</sup> zes genitaal-zuignappen in plaats van 4. Beschrijving en teekening zullen verschijnen in het *Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereeniging*.

A. C. OUDEMANS.

---

*Parasitus sexclavatus*, nov. sp.

Gekenmerkt door het bezit van 6 korte kolfvormige haren aan de buikzijde van het lichaam, vond ik op *Geotrupes sylvaticus*, in April 1901 te Arnhem. De soort is nieuw. Zij wordt beschreven en afgebeeld in het *Tijdschr. der Ned. Dierk. Vereeniging*.

A. C. OUDEMANS.

---

*Parasitus vespillonum*, nov. sp.

Deze soort vond ik als deutonympha op *Necrophorus vespillo* te Arnhem in April. Daar zij nieuw was, beschreef ik haar en beeldde haar af voor het *Tijdschrift voor Entomologie*. Zij heeft geen hyalien blaadje aan de mandibels, en een driepuntig epistoom. Later vond ik de *tritonympha* op *Geotrupes sylvaticus*.

A. C. OUDEMANS.

---

*Tyroglyphus fucorum*, nov. sp.

Den hypopusvorm van deze nieuwe soort vond ik op *Bombus terrestris* in April te Arnhem. Deze hypopus onderscheidt zich vooral door het gemis van kleine zuignappen bij de coxae 2 en 3.

A. C. OUDEMANS.

---