

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

---

N<sup>o</sup>. 5.

1 Mei 1902.

INHOUD: Dr. J. TH. OUDEMANS, Een paar nadere bijzonderheden betreffende *Odontosia* (*Lophopteryx*) *carmelita* Esp. en *Leucodonta* (*Notodonta*) *bicoloria* Schiff. — Dr. C. L. REUVENS, Litteratuur.

---

## Een paar nadere bijzonderheden betreffende

*Odontosia* (*Lophopteryx*) *carmelita* Esp.

en

*Leucodonta* (*Notodonta*) *bicoloria* Schiff.

Deze beide voor onze fauna nieuwe Lepidoptera werden reeds op p. 16 dezer « Entomologische Berichten » vermeld. Nadere informatie, mij door de ontdekkers verstrekt, leerde mij het volgende:

### *O d o n t o s i a* Esp.

Er zijn in 1901 drie exemplaren van dezen vlinder gevangen, alle door den heer Kruitbosch, te Rozendaal (Geld.) Het eerste voorwerp, een ♂, werd aangetroffen op 23 April, de beide andere op 30 April en wel gepaard. Het ♂ van dit paar berust thans in mijne verzameling. De vlinders zaten in eene laan, tegen berkenstammen, ongeveer op manshoogte. De laan is aan de oostzijde begrensd door bouwland, aan de westzijde door sparrenbosch. Ik kan hieraan nog toevoegen, dat het mij afgestane voorwerp zeer gaaf is en eene vlucht heeft van 46 mm. Volgens den catalogus

van Staudinger en Rebel komt de soort voor in Midden-Europa (behalve Nederland), Zuidelijk Scandinavië, Noordwestelijk Rusland, Catalonië en Noordelijk Italië. Meyrick vermeldt haar als zeldzaam en plaatselijk voor Groot-Brittannië. Zij was dus wel min of meer bij ons te verwachten, waarop ook Snellen vroeger de aandacht vestigde in zijne « Vlinders van Nederland », *Macrolepidoptera*, p. 221 noot. Ten slotte zij nog vermeld, dat de rups op berk leeft en groen is met eene gele zijdestreep, waarin de zwarte stigmata staan, die rood begrensd zijn.

*Leucodonta bicoloria* Schiff.

Het door den heer Berends op 24 Juni 1900 aangetroffen exemplaar werd door hem gevangen tusschen braamstruiken nabij den stal van het logement « Beekhuizen » bij Velp, gemeente Rheden. De heer Berends vermoedt, dat hij het diertje heeft opgejaagd; het fladderde plotseling voor hem uit over den grond. Berken, het voedsel der rups, staan in de nabijheid. Deze laatste is bleekgroen, met eenige donkerder groene overlansche lijnen, waarin ook de zwarte, witgerande stigmata staan. Volgens Staudinger en Rebel wordt deze soort gevonden in Midden-Europa en Zuidelijk Noord-Europa (« Eur. c. et s. m. ») en werd zij verder aangetroffen in verschillende streken van Azië, tot in Japan toe. Meyrick geeft Devon, Stafford en Zuid-Ierland op, waar zij zeldzaam en zeer plaatselijk is.

J. TH. OUDEMANS.

---