

Buikzijde: Genu 1, tibia 1, coxa 2, trochanter 2, genu 2, tibia 2, femur 3, genu 3, tibia 3, genu 4 en tibia 4 ieder met 1 zwaren borstel en femur 2 met 2 zware borstels, allen naar buiten gekeerd. Op *Plecotus auritus* — Duitschland.

*Spinturnix carnifex*. (C. L. Koch.).

♂. 880 mikron. Stigma dorsaal. Daarachter 7 stijve borstels. Op 't abdomen 6 dito. Buikzijde: De zware borstels aan de pooten als bij *S. plecoti*; bovendien aan trochanter 1 een kleinere, naar buiten gekeerd. Sterni-genitaalschild lang, peervormig, steel naar voren gericht. — Op *Vesperugo noctula*. Duitschland.

A. C. OUDEMANS.

---

### **Bupalia Piniaria L.**

Op 15 en 16 Augustus las men in verschillende bladen, dat in het Roekelsche bosch nabij Ede, de gestreepte dennerups *Bupalia (Filonia) Piniaria L.* belangrijke verwoestingen heeft aangericht en dat deze nog veel aanzienlijker zouden geweest zijn, indien niet eene menigte kraaien (?) op het bosch waren neergestreken, die de rupsen krachtig te keer gingen. Deze rupsen nu, gelijken door de overlansche gele en witte strepen op eene groene grondkleur op de ten deele groene, ten deele al verdroogde dennennaalden, waarop zij leven en bezitten dus dat wat men eene beschermende kleuring gewoon is te noemen. Tegen die kraaien schijnt haar dit evenwel al zeer weinig te beschermen. Omgekeerd beletten de kraaien ook weder niet dat zij dikwijls in menigte en daarom zeer schadelijk optreedt.

M. C. PIEPERS

---

### **Coleoptera.**

Op 5 en 6 Juni 1902 bij Winterswijk gevangen.

<i>Carabus auronitens</i> F. ♂ ♀	<i>Elaphrus aureus</i> Müll. Faun. nov. sp.
» <i>arvensis</i> Herbst.	<i>Bembidium litorale</i> Oliv.
<i>Omophron limbatus</i> F.	<i>Amara convexior</i> Steph.