

Leucorrhinia pectoralis Charp.

Hiervan ving ik in Juli een viertal exemplaren bij den Haag. Tot nog toe was zij in Holland alleen bij Rotterdam en in de Oostelijke provinciën waargenomen.

Scheveningen, Nov. 1902.

H. W. VAN DER WEELE.

Attacus cynthia F. op berk gekweekt

In de Wintervergadering der Ned. Entom. Vereeniging te Utrecht, 19 Januari 1902, werd door mij medegedeeld dat in een kooi met Trichiosoma-larven welke op berk gekweekt werden, 31 Juli 1901, een jong Cynthia-rupsje gevonden werd. Het vrat berk en was afkomstig uit eieren van een Cynthia-vlinder, welke vroeger in hetzelfde verblijf vertoefd had.

De rups, welke verder uitsluitend met berk gevoed werd, groeide voorspoedig op en spon zich 7 Sept. in. Uit den overwinterden cocon verscheen 27 Juni 1902 een normale vrouwelijke vlinder van gewone grootte.

Voor zoover mij bekend, was het nog niet waargenomen dat Cynthia-rupsen gemakkelijk met berkenloof groot te brengen zijn. Door de Roo van Westmaas en de Graaf werd bevonden dat zij ook op sering en vooral op *Cerasus Pennsylvanica* met gunstig gevolg te kweken zijn. (*Tijdschr. v. Entom. Eerste Serie, Deel V*). Jonge rupsen vreten ook kastanje, eik en vlier, maar dit voedsel bekomt haar slecht, zoodat zij bezwijken; VerLoren bemerkte dat zij met graagte van notenboombladeren gebruik maken. Taschenberg wijst er op dat de Cynthia rupsen, welke in Assam enz. op Ailanthus en Ricinus voorkomen, in Europa steeds minder kieskeurig ten opzichte van het voedsel geworden zijn, hij noemt ten bewijze daarvan nog de volgende planten waarop zij gekweekt werden: wever-kaardebol, berberis, ahorn, kamfer-laurier, *Eliodendron orientale*, *Rhus typhina* en andere Rhus-soorten van de Kaap. Zij schijnen dus polyphaag te worden.

VAN ROSSUM.