

**Boreus hyemalis L.**

S n e e u w v l o o .

Eene nieuwe Nederlandsche Panorpipe.

Van den heer de Vos tot Nederveen Cappel te Velp bij Arnhem ontving ik een vrouwelijk exemplaar dezer soort, door hem op 12 Maart 1901 aldaar gevangen. Dr. J. Th. Oudemans was zoo goed het diertje op de wintervergadering der Ned. Ent. Vereeniging te Utrecht te bestemmen. De kenmerken zijn: Kop snuitvormig, vleugels rudimentair, bij den man lichtbruin, priemvormig opstaande, bij het wijfje zeer kort, tegen het lijf aangesloten. Lichaam bronsachtig bruin. Bijooogen ontbreken; oogen bolvormig. De man heeft geene schaar, zooals de echte schorpioenvliegen; het wijfje bezit eene legboor. Lengte 3—4 millimeter.

Deze dieren komen in October en Maart voor op mos en worden ook wel op smeltende sneeuw gevonden. Voedsel onbekend. Waarschijnlijk vallen zij bij het zeven dikwijls in handen van coleopterologen, worden dan wellicht aangezien voor jonge krekels en met mijten, spinnetjes en dergelijke als waardeloos ongedierte weggevoerd.

Mr. Herman Albarda vermeldt *B. hyemalis* als voorkomende in Rijn-Pruissen en Westfalen. Ook is de soort gevonden in België, bij Brussel.

H. W. VAN DER WEELE.

**Brephos parthenias L.**

I n H o l l a n d .

Op 13 Maart 1903 in de Waalsdorpsche duinen bij 's Gravenhage eene excursie makende, ving ik aldaar een mannelijk exemplaar der bovengenoemde vlindersoort dat om dennen vloog. In de vlucht herinnert het dier aan *Bupalus piniarius* L. waarvoor ik het dan ook op het eerste gezicht hield, doch ik herinnerde mij