

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 13.

1 September 1903.

INHOUD: Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische aantekeningen VII. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, C. G. A. Brischke. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, Hybride van *Zygaena minos* Hb. ♀ en *Syntomis phegea* L. ♂. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Diefstal met inbraak bij *Nola confusalis* v. Hein. — Dr. J. TH. OUDEMANS. Over het aantal der eieren bij vlinders.

Acarologische Aantekeningen, VII.

Emeus inexpectatus, nov. sp.; ♂ 504, ♀ 570—640 μ . Licht stroogeel; ovaal met de punt naar voren. Op den rug loopen 2 strepen evenwijdig aan zijden en voorrand, dus parabolen met de opening naar achteren; geheel vooraan twee op oogen gelijkende lichte vlekken; rughaartjes uiterst weinig en klein. Rugschild buikwaarts omgeslagen. Pooten klein, zoodat de diertjes op *Uropoda* gelijken. — Eiland Borkum.

Thrombus, nov. gen.; onderscheidt zich van *Thrombidium* en *Thrombella* voornamelijk door de volgende kenmerken. 1. De rug is onbehaard. 2. Geen onderscheid tusschen cephalothorax en abdomen. 3. Oogen ver naar achteren, ongeveer op het midden van den rug. 4. Peritrema niet naar voren loopend, in den snuit, maar zijwaarts langs den voorrand van het lichaam. 5. Er is een rugschild aanwezig. 6. De palpen slechts 4-ledig.

Thrombus gymnus, nov. sp.; 1360 μ .; vermoedelijk vuurrood; kort ovaal; 4e poot zeer lang, 2840 μ , zonder een springpoot te zijn. Rugschild een liggende lange zeshoek met 3 paar chitineuse ringetjes en erosiegroefjes. Daarvóór een driehoekig schildje (crista)

met 2 pseudostigmata. De speud. organen waren niet aanwezig: het exemplaar was gedeeltelijk vergaan. Twee dubbeloogen. Op den achterrug 4 paar chitineuse ringetjes. Op den buik 3 paar chitineuse ringetjes en eenige haren. Geen genitaal-zuignappen. Op de pootleden ook eenige chitineuse ringetjes. — Eiland Borkum.

Erythraeus ignotus, nov. sp. *Larva* 880 μ . Gelijkt op *E. Lomani* Oudms., maar heeft kortere pooten, en behaarde knotsvormige haren. — Eiland Borkum.

Erythraeus glaber, nov. sp. *Protonympha* 1280 μ . Ovaal, top naar voren, glanzend, met uiterst fijne haartjes. Achterste areola der crista met 1 pseudostigma. Vertex met 4 haren en 2 psstg. Psstg. organen fijne haartjes. Twee enkelvoudige oogen. Palpen kort, dik; klauw met een ventralen tand; tarsus zeer kort, vierkant. Pooten kort, slank.

Erythraeus flavus, nov. sp. *Deutonympha* 960 μ . Waarschijnlijk geelbruin. Gelijkt op *E. phalangioides* (de Geer). Haren staafvormig, zelf weinig behaard. Vertex met 4 haren en 2 psstg. Achterste areola met 2 pseud. Psstg. organen fijne haartjes. Twee dubbeloogen. Palpen slank; klauw met een ventralen tand; tarsus knotsvormig, nauwelijks voorbij den klauwtop reikend — Eiland Borkum.

Hydrarachna tectocervix, nov. sp. *Larva* 480 μ .; bloedrood; lang ovaal, top naar voren. Kopschild buikwaarts omgebogen, met overl. strepen, en 2 pseudostigmata (tot dusver niet bij *Hydrarachniden* ontdekt). Nekschild bijna halvemaanvormig. Geen oogen. Coxae 1 en 2 vereenigd. Coxa 3 ver er vandaan. Palp met hangenden tarsus evenals bij *Thrombidium* (tot dusver nog niet bij larven van *Hydrarachniden* opgemerkt). — Eiland Borkum.

Scutovertex schneideri, nov. sp., 720 μ . Donkerbruin. Rug gekorrelt. Lamellae nauwelijks als lijntjes zichtbaar. Geen pseudostigmata. Overgang tusschen cepth. en abd. met duidelijken V. Tarsi met 1 klauw en zonder de 4 distaal omgebogen haren. — Eiland Borkum.

A. C. OUDEMANS.