

Lycaena Optilete Knoch.

De Heer Kooi heeft hij Groningen deze soort gevangen. Voor die provincie is dit eene nova species.

D. TER HAAR.

Voedselplanten van *Depressaria heracliana* de Geer en *Olethreutes (Penthina) betulaetana* Hw.

Als voedselplanten van *Depressaria heracliana* de Geer vindt men alleen opgegeven *Heracleum sphondylium* L. en *Pastinaca sativa* L. Ik vond echter het vorig jaar te Vlissingen de rups in aantal, bijna volwassen, ook op *Foeniculum officinale* All. (venkel).

Eveneens bleek mij, dat *Olethreutes betulaetana* Hw. niet, gelijk wordt vermeld, uitsluitend op berk voorkomt. Nabij Zeddam klopte ik dit jaar de rups ook uit eik en kweekte haar met deze voedselplant verder ook gemakkelijk tot vlinder op.

P. HAVERHORST.

De zomer van 1903 en de vliegtijd van sommige vlinders.

Als bijdrage over den invloed, welken deze weinig zomersche zomer op den vliegtijd van sommige vlinders kan hebben uitgeoefend, diene, dat ik in de laatste dagen van Augustus in den omtrek van Wageningen frissche, blijkbaar pas uitgekomen voorwerpen vond o. a. van *Drepana binaria* Hufn., *Pheosia dictaeoides* Esp., *Abraxas adustata* Schiff. en *Gnophos obscuraria* Hb.

Eene (in de vrije natuur) gekweekte rups van *Dasychira fascelina* L. leverde den vlinder eerst op 20 Augustus, terwijl van een paar (eveneens buiten) gekweekte rupsen van *Lasiocampa trifolii* Esp. *ab. medicaginis* Bkh. de eerste vlinder pas op 1 September verscheen.

P. HAVERHORST.

Eigenaardige versiering door Hooiwagens.

Onlangs op eene wandeling, werd mijne aandacht getrokken door eene eigenaardige versiering van den witten muur onder het overhangend dak van een tuinhuis. Eene plek ter grootte van enkele vierkante decimeters scheen te zijn volgeteekend met talrijke, kleine,