

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

Nº. 20.

1 November 1904.

INHOUD: Jhr. Dr. ED. EVERTS, Coleoptera, welke het meer zuidelijk kustgebied, nl. van Frankrijk en Zuid-Engeland, bewonen, doch ook langs of nabij de Nederlandsche kust gevangen zijn. — Jhr. Dr. ED. EVERTS, Lijst van Coleoptera, gevangen in de omstreken van Winterswijk en Eibergen, vóór en na de Zomervergadering der Ned. Ent. Ver., Juli 1904. — Mr. A. F. A. LEESBERG, Coleoptera, gevonden op eene excursie te Wylre, Juli 1904. — Mr. A. F. A. LEESBERG, Coleoptera, in Arachiden-noten gevonden, Augustus-September 1904. — A. H. VAN DER WEELE, *Sciapteron tabaniformis* Rott. — A. H. VAN DER WEELE, Formol als doodelijke lekkernij voor insecten. — D. TER HAAR, *Acronycta cuspis* Hb. — Dr. J. TH. OUDEMANS, *Acronycta cuspis* Hb. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Kannibalisme bij Lepidoptera-larven. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XIV. — Dr. A. C. OUDEMANS, Wonderbaarlijke Arthropoden. — P. HAVERHORST, Eene imago van *Smerinthus populi* L. uit eene aangestoken rups. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, Nachtdieren onder de Sluipwespen. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Indische Insecten te koop.

Coleoptera, welke het meer zuidelijk kustgebied, nl. van Frankrijk en Zuid-Engeland, bewonen, doch ook langs of nabij de Nederlandsche kust gevangen zijn.

Naar aanleiding van het ontdekken van *Cicindela trisignata* Latr. op het begroeide strand van Oostvoorne en het vangen van een groot aantal exemplaren dezer soort door verscheidene entomologen,

acht ik het niet ondienstig te wijzen op het voorkomen van meerdere, in zuidelijker streken thuis behorende keversoorten. Daar genoemde soorten, naar het schijnt, niet langs de Duitsche kust bekend zijn, meen ik den grooten rijkdom aan keversoorten bij ons aan den meer directen invloed van den golfstroom te moeten toeschrijven; het Nederlandsch en natuurlijk ook het Belgisch kustgebied vertoonen nog invloeden op de insectenwereld, die aan de Fransche en Engelsche kusten eigen zijn, doch noordelijker verdwijnen ¹⁾).

Pogonus litoralis Dfts., in Zeeland.

Acupalpus elegans Dej., Zierikzee, Amsterdam.

Bidessus bicarinatus Latr., Bergen-op-Zoom.

Arena Octavii Fauvel, Scheveningen, strand.

Staphylinus minax Muls. & Rey, Leiden (vermoedelijk Katwijk).

Philonthus dimidiatipennis Er., Amsterdam, Zierikzee, Vlissingen.

Xantholinus cribripennis Fauvel, Noordwijk.

Omalium rugulipenne Rye, Texel.

Actinopteryx fucicola Allib., Scheveningen.

Saprinus maritimus Steph., Scheveningen.

» *crassipes* Er., Scheveningen.

Aeritus punctum Aubé, Scheveningen.

Bothriophorus atomus Muls., Texel.

Berosus affinis Brullé, Zeeland.

Athous difformis Lac., Zeeland, Rotterdam.

Cleonus emarginatus F., Wassenaar, strand.

Pentharthrum Huttoni Woll., Amsterdam ²⁾).

Apion limonii Kirby, Zierikzee, Bergen-op-Zoom.

ED. EVERTS.

1) Niet alleen langs onze kust, maar ook in de andere deelen van ons land zijn keversoorten waargenomen, die in het omliggend Duitsch en Belgisch gebied onbekend zijn, doch in meer zuidelijk gelegen streken voorkomen.

2) Deze soort werd ook in den Haag op wijnvaten aangetroffen. — Wat levenswijze en voorkomen der hierboven vermelde soorten aangaat, zie in de „Coleoptera Neerlandica.”