

**Lijst van Coleoptera, gevangen in de omstreken van
Winterswijk en Eibergen, vóór en na de Zomer-
vergadering der Ned. Ent. Ver., Juli 1904.**

Elaphrus aureus Müll., in aantal langs de Slingerbeek.

» *Ullrichii* W. Redt., zeldzamer.

Dyschirius politus Dej.

Tachypus pallipes Dfts.

Bembidium litorale Oliv.

» *obliquum* St.

» *Doris* Gylh.

» *lunulatum* Fourcr.

Trechus discus F.

Epaphius secalis Payk.

Patrobus excavatus Payk.

Olisthopus rotundatus Payk.

Platynus versutus St.

Pterostichus angustatus Dfts.

Hydroporus memnonius Nic.

Ilybius aenescens Thoms.

Dytiscus punctulatus F.

Ocalea picata Steph.

Tachyusa atra Grav.

» *umbratica* Er.

» *scitula* Er.

» *constricta* Er.

» *coarctata* Er.

Hygronoma dimidiata Grav.

Myllaena intermedia Er.

» *gracilicornis* Fairm. et Ch. Bris. Faun. nov. sp.

» *elongata* Matth.

Gymnusa brevicollis Payk.

Staphylinus compressus Mrsh.

Philonthus punctus Grav.

Actobius cinerascens Grav.

Lathrobium foveolum Steph.

Lathrobium terminatum Grav.

Medon ripicola Kr.

Scopæus laevigatus Gylh.

Stenus guttula Müll.

» *fossulatus* Er.

» *providus* Er., met den vorm *Rogeri* Kr.

» *vafellus* Er.

» *Argus* Grav.

» *pubescens* Steph.

» *foveicollis* Kr.

» *opticus* Grav.

Bledius fracticornis Payk.

» *subterraneus* Er.

» *denticollis* Fauvel (*obscurus* Muls. & Rey), in aantal bij Eibergen, langs de Berkel.

Haploderus cuelatus Grav.

Anthophagus praeustus Müll.

Triarthron Märkelii Schmidt. Faun. nov. sp. Eén exemplaar 's avonds van gras gesleept.

Agathidium seminulum L.

Clambus minutus St.

. *Ptenidium fuscicorne* Er.

Ptilium exaratum Allib.

Onthophilus striatus Forst.

Meligethes coeruleovirens Först.

Thalycera fervida Oliv.

Telmatophilus typhae Fall.

Paramecosoma melanocephalum Herbst

Atomaria fuscicollis Mannh.

» *pusilla* Schönh.

Monotoma picipes Hrbst

Litargus bifasciatus F.

Limnichus pygmaeus St.

Parnus nitidulus Heer

Limnebius papposus Muls.

- Limnebius crinifer* Rey
Cercyon marinus Thoms.
 » *bifenestratus* Küst.
Helophorus arvernicus Muls.
 » *pumilio* Er.
Hydrochus angustatus Germ.
 » *elongatus* Schall.
 » *carinatus* Germ.
Ochthebius bicolon Germ. ab. c. *rufomarginatus* Er.
Hydraena riparia Kugel. ♂.
Anthaxia quadripunctata L.
Agrilus elongatus Herbst
Hypnoidus quadripustulatus F.
Athous rhombens Er.
Malthodes dispar Germ.
Axinotarsus ruficollis Oliv.
Dasytes niger L.
Abdera triguttata Gyll.
Mordella aculeata L.
Chrysanthia viridis Schmidt
Acmaeops marginata F. ab. c. *spallicea* Schilsky. Faun. nov.
 sp. et ab. ¹⁾
Leptura attenuata L.
Crepidodera splendens Weise
Deporaus megacephalus Germ.
Byctiscus populi L.
Orchestes rusci Herbst
Tupinotus sellatus F.
Phytobius quadricornis Gyll.
Apion dispar Germ.
 » *Spencei* Kirby.
Pityophthorus ramulorum Perris

1) Deze interessante soort komt voor in Noord-Europa (Zweden, Finland, Oost-Prusen, Silezië en vermoedelijk ook bij Berlijn).

Crypturgus pusillus Gyll.

Tomicus suturalis Gyll.

ED. EVERTS.

**Coleoptera, gevonden op eene excursie te Wylre,
Juli 1904.**

Eene kleine excursie te Wylre, gaf mij in Juli 1904 de volgende interessante soorten. Over het algemeen was het te droog, zoodat uitsluitend onder schors en aan den waterkant de vangst iets opleverde.

Bembidion brunnicorne Dej. (slechts in 1 ex, uit Houthem bekend).

Philonthus splendidulus Grav.

Baptolinus affinis Payk.

Stenus fossulatus Er. (schors)

Siagonium quadricorne Kirby »

Agathidium nigripenne Kug. »

» *seminulum* L. »

Silvanus unidentatus Oliv. »

Malthodes dispar Germ.

» *mysticus* Kiesw.

Lissodema 4-pustulatum Marsh.

Ceutorrhynchus trimaculatus F.

Cossonus planatus Bed. »

A. F. A. LEESBERG.

**Coleoptera, in Arachiden-noten gevonden.
Augustus—September 1904.**

Plochionus pallens F. ♂ ♀. 8 ex.

Carpophilus dimidiatus F. 25 ex.

Silvanus mercator Fauv. 50 ex.

Trogosita mauritanica L.

Dermestes vulpinus F. en var. *senex* Germ. 50 ex.

» *domesticus* Germ. 1 ex.