

Dermestes lardarius L. in aantal.

Attagenus cinnamomeus Roth. (*unifasciatus* Fairm.), zeer karakteristiek door een bruinen band vóór het midden over de elytra, cosmopoliet; Faun. nov. sp. 2 ex.

Trogoderma granarium Everts (uitgekleurde ex.) 8 ex.

Opetiopalpus scutellaris Panz. Faun. nov. sp. 1 ex.

Lasioderma testacea Dfs. 12 ex.

Alphitobius diaperinus Panz.

» *piceus* Ol.

Tribolium confusum Duv.

» *ferrugineum* F.

N.B. De exemplaren waren allen springlevend; bovendien vond ik nog tusschen de noten een dood ex. van *Pimelia inflata* Herbst.

A. F. A. LEESBERG.

Sciapteron tabaniformis Rott.

Dezen zomer kreeg ik een 20-tal in hout levende rupsen uit een jongen abeel in onzen tuin. Zij hadden, dicht bij elkaar levende, een gedeelte van den stam van 15 à 20 centimeters lang totaal doorknaagd, zoodat door sterken wind het boompje afgebroken was.

Hoewel de rupsen door den tuinman uit het hout waren gehaald en vele daardoor beschadigd waren, besloot ik toch, met zooveel van het doorknaagde hout als ik bijeen kon vinden, te probeeren, de mij toenmaals onbekende rupsen tot verpopping te brengen. Slechts 2 er van sponnen zich in en leverden 2 poppen, waarvan er echter maar 1 uitkwam; de andere verdroogde. Het uitgekropen exemplaar is waarschijnlijk een ♂; het berust in de collectie van den heer P. Haverhorst te Rotterdam. Ook voor eenige jaren kreeg ik van den heer J. B. Corporaal een mooi exemplaar, door hem bij Den Haag in Juli gevangen. Het is in mijne collectie in de zoölogische verzameling te Utrecht.

Het is zeker merkwaardig, dat deze Sesiide, wáár zij voorkomt,

in aantal te vinden zal zijn, want een groot aantal larven, in zulk eene kleine ruimte vereenigd, moet natuurlijk weder een aantal vlinders voortbrengen, die misschien niet eens heel ver van hunne geboorteplaats weder andere boomen zullen aantasten. Ik meen met zekerheid ook nog takken van andere abceelen aangetast gezien te hebben.

A. H. VAN DER WEELE.

Formol als doodelijke lekkernij voor insecten.

Voor eenige jaren las ik in de couranten, dat een Fransch geleerde ontdekte, dat formol een uitstekend middel was, om kamervliegen te verdelgen. Men moest dan een theeschoteltje met eene waterige oplossing van formaldehyde in de kamer neerzetten en binnen weinige uren waren alle vliegen gestorven, daar zij gaarne van de formol drinken en dientengevolge binnen korten tijd omkomen. Ik nam toen de proef, maar zonder zichtbaar resultaat, zoodat ik meende, dat het bericht een praatje uit den komkommertijd was. Dezer dagen echter, veel gebruik makende van formol voor het conserveeren van insecten, viel het mij op, dat wanneer een schaalje niet volkomen was afgedekt, er altijd na eenige uren een of meer stoffluisjes, *Clothilla pulsatoria* L., in te vinden waren. De diertjes waren dood en dreven op de oppervlakte. In een slecht afgedekt bakje, dat ik eene week in mijne kast had laten staan, vond ik 5 doode stoffluisjes, ofschoon de opening, waardoor zij binnen konden komen, misschien maar 1 mM² groot was, d. i. net groot genoeg, om er één tegelijk door te laten. Alle waren volwassen exemplaren. Toen ik in den tijd, dat er zeer veel kamervliegen in huis waren, een klein wasbakje met verontreinigde formoloplossing onafgedekt op mijne tafel zette, zag ik eene vlieg, naar het mij toescheen toevallig, in de nabijheid van het bakje komen en van het vocht drinken. Zij vloog een eindje weg, maar kwam dadelijk weer terug, om er weer van te drinken; dit herhaalde zij zoo eenigen tijd achtereen, steeds naar de drinkplaats terugkeerend. Zichtbaar werden hare bewegingen langzamer. Eindelijk zat ze weer op de tafel, viel om, trok eenigen tijd met de pooten, zooals insecten