

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

 N^o. 22.

1 Maart 1905.

INHOUD: Dr J. C. H. DE MEIJERE, Lijst van Diptera, gevonden bij Winterswijk, ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereeniging, Juli 1904. — Mr. A. F. A. LEESBERG, Corrigenda et addenda (Coleoptera). — Dr. J. Th. OUDEMANS, De rupsen van *Acronicta psi* L. en tridens Schiff. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XVI. — Dr. C. L. REUVENS, Literatuur.

Lijst van Diptera, gevonden bij Winterswijk, ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereeniging, Juli 1904.

Harmandia cristata Kieff. Fn. n. sp. Deze soort is identisch met *H. crumenalis* Kieff. en *cavernosa* Rübs. De gallen van deze en van de volgende soort werden te Winterswijk op *Populus tremula* L. aangetroffen.

* » *globuli* Rübs.

Simulium reptans L.

Dixa aestivalis Meig.

Symplecta punctipennis Meig.

* *Hilara pseudochorica* Strobl, Fn. n. sp.

» *argyrosoma* Strobl, Fn. n. sp.

* *Drapetis setigera* Löw, Fn. n. sp.

Dolichopus popularis Wied.

» *longicornis* Stann.

» *trivialis* Hal.

* *Teuchophorus monacanthus* Löw, Fn. n. sp.

» *calcaratus* Macq. Fn. n. sp.

Lonchoptera fuscipennis Boh. Fn. n. sp.

Leptopa filiformis Zett.

Norellia flavicauda Meig.

Peplomyza Wiedemanni Löw, Fn. n. sp.

Oscinis plumiger Meig.

* *Ilyadina nitida* Macq. Fn. n. sp.

Parydra quadripunctata Meig.

Ilythea spilota Curt.

* *Scatophila caviceps* Stenh. Fn. n. sp.

De met een * voorziene soorten waren mij na het verschijnen der «Nieuwe Naamlijst» ook reeds van elders als inlandsch bekend geworden, maar werden nog niet als zoodanig vermeld.

J. C. H. DE MEIJERE.

Corrigenda et addenda (Coleoptera).

Volgens een schrijven van den Heer A. Fauvel te Caen, moet de door mij vermelde *Attagenus cinnamomeus* Roth (*unifasciatus*, *subfasciatus*) den nog ouderen naam dragen van *A. gloriosae* F., reeds door Fabricius beschreven, Syst. El., 1, 107. Zie Revue Ent. 1903 pag. 333.

De Heer Fauvel ontving die soort uit Nieuw-Caledonië.

Atomaria versicolor Er. = *ornata* Reitt. (nec Heer) komt het geheele jaar op schimmel voor. Ik ving ze nog in December, tegelijk met *Pentarthrum Huttoni* Woll. ♂ en ♀. Wat deze snuitkevers op schimmel doen, is mij nog niet gebleken. Bedel zegt: «Côtes maritimes dans les vieilles boiseries.» Nu zijn die wijnvaten zeker niet oud, maar wellicht ontwikkelen zij zich uit de balken van het pakhuis, dat ± 40 jaar oud zal zijn. Curieus blijft, dat men ze niet elders (behalve één ex. te Amsterdam onder schors) aantreft.

Het ♂ van *Pentarthrum* is gemakkelijk te herkennen aan den veel breederen snuit, die vrij sterk bestippeld is en bij het ♀ zeer dun en glanzend is. Uit België wordt die soort, voor zoover mij bekend, niet vermeld. Wel van de Normandische kust en de daar-tegenover liggende Engelsche kust.

Ook *Symbiotes gibberosus* Luc., door mij thans in een twaalftal ex. gevangen, is een interessant diertje. Het gelijkt in kleur veel op lichte exx. van *Mycetaea hirta* Marsh., maar mist de sterke beharing dier laatste soort. Het ♂ is smaller dan het en