

Peplomyza Wiedemanni Löw, Fn. n. sp.

Oscinis plumiger Meig.

* *Ilyadina nitida* Macq. Fn. n. sp.

Parydra quadripunctata Meig.

Ilythea spilota Curt.

* *Scatophila caviceps* Stenh. Fn. n. sp.

De met een * voorziene soorten waren mij na het verschijnen der «Nieuwe Naamlijst» ook reeds van elders als inlandsch bekend geworden, maar werden nog niet als zoodanig vermeld.

J. C. H. DE MEIJERE.

Corrigenda et addenda (Coleoptera).

Volgens een schrijven van den Heer A. Fauvel te Caen, moet de door mij vermelde *Attagenus cinnamomeus* Roth (*unifasciatus*, *subfasciatus*) den nog ouderen naam dragen van *A. gloriosae* F., reeds door Fabricius beschreven, Syst. El., 1, 107. Zie Revue Ent. 1903 pag. 333.

De Heer Fauvel ontving die soort uit Nieuw-Caledonië.

Atomaria versicolor Er. = *ornata* Reitt. (nec Heer) komt het geheele jaar op schimmel voor. Ik ving ze nog in December, tegelijk met *Pentarthrum Huttoni* Woll. ♂ en ♀. Wat deze snuitkevers op schimmel doen, is mij nog niet gebleken. Bedel zegt: «Côtes maritimes dans les vieilles boiseries.» Nu zijn die wijnvaten zeker niet oud, maar wellicht ontwikkelen zij zich uit de balken van het pakhuis, dat ± 40 jaar oud zal zijn. Curieus blijft, dat men ze niet elders (behalve één ex. te Amsterdam onder schors) aantreft.

Het ♂ van *Pentarthrum* is gemakkelijk te herkennen aan den veel brederen snuit, die vrij sterk bestippeld is en bij het ♀ zeer dun en glanzend is. Uit België wordt die soort, voor zoover mij bekend, niet vermeld. Wel van de Normandische kust en de daar-tegenover liggende Engelsche kust.

Ook *Symbiotes gibberosus* Luc., door mij thans in een twaalftal ex. gevangen, is een interessant diertje. Het gelijkt in kleur veel op lichte exx. van *Mycetaea hirta* Marsh., maar mist de sterke beharing dier laatste soort. Het ♂ is smaller dan het en

vertoont aan de uiteinden der beide dekschilden een verheven korreltje of bultje. Onder de massa *Cryptophagus dentatus* Herbst en *subfumatus* Kr. vond ik ook verscheidene *C. scanicus* L. var. *patruelis* Sturm.

Enicmus minutus L. komt in allerlei kleuren voor, van stroogeel tot dof zwart. Het mocht mij niet gelukken, ofschoon ik exx. van den heer Gerhardt uit Liegnitz ontving, zijn *E. anthracinus* Mannh. verschillend te vinden van den zoo zeer varieerenden *minutus*. Ik geloof eerder met Ganglbauer, dat wij slechts met eene variëteit te doen hebben.

Lathridius Bergrothi Reitt. en *Atomaria munda* Er. zijn minder talrijk, maar komen toch nog al voor.

Een unicum bleef het ex. van *Holoparamecus Ragusae* Reitt, en wel curieus mag het genoemd worden, dat ik van Dr. Everts, die gaarne het inlandsche ex. bezat, in ruil daarvoor ontving een bij Reitter gekocht voorwerp met het etiket «Niederlande.» Waar is dat dier van daan? Uit België was de soort door Reitter vermeld.

Orthoperus punctum Marsh. komt ook in verschillende kleurvariëteiten voor, van blinkend zwart tot lichtbruin.

Sporadisch schijnt ook op schimmel te leven *Omalium depressum* Grav. en *Hypocyptus ovulum* Heer. Misschien jagen die op de larven der andere soorten.

Silvanus bilentatus F. is met *Mycetaea hirta* Marsh. de meest voorkomende soort, maar de eerste is veel constanter van kleur en erg breekbaar, zoodat in spiritus dikwijls de kop loslaat.

Laatst ving ik terzelfder plaatse *Corticaria fulva* Com. en *C. serrata* Payk., blijkbaar ook schimmeldieren.

A. F. A. LEESBERG.

De rupsen van *Acronieta psi* L. en *tridens* Schiff.

In den voorzomer van 1904 vond ik in de duinen bij Bloemendaal een wijfje eener *Acronieta*, die ik meende voor *Acr. psi* L. te mogen houden, wat later bleek juist te zijn. Dat de determinatie onder voorbehoud geschiedde, zal ieder Lepidopteroloog begrijpen, daar de imagines der beide soorten, welke namen boven deze mededeeling staan, niet zelden zooveel overeenkomst vertoonen, dat