



Pyrausta despicata
(weegbreemot)
Foto: Gerard Bergsma



Athetis pallustris (moerasspirea-uil)
Foto: Gerrit Tuinstra



Perizoma bifaciata (donkere
ogentroostspanner) Foto: Gerrit Tuinstra



Mythimna obsoleta (gestreepte rietuil)
Foto: Andy Saunders



Graphiphora augur (dubbelpijl-uil)
foto: Andy Saunders

Tot slot wil ik nog twee soorten noemen die de moeite waard zijn om even apart te vermelden. Het gaat om de dubbelpijl-uil (*Graphiphora augur*) (foto blzd. 19) en de plakker (*Lymantria dispar*). De dubbelpijl-uil is beslist geen algemene vlinder in Nederland. Het kaartje op Vlindernet, dat waarnemingen van de vlinder in de periode van 1980 tot september 2011 laat zien, toont in verhouding vrij veel waarnemingen uit het zuiden van Friesland en het noordwesten van Overijssel. Deze vrij forse uil werd door Andy gezien in de eendenkooi op 18 juni en 4 juli 2006.


De plakker is in grote delen van Nederland een erg algemene vlinder, die soms in grote aantallen waargenomen wordt, maar juist in het noorden van Nederland veel minder algemeen is. In Friesland wordt de vlinder sporadisch waargenomen. Andy ving op 1 augustus 2011 een exemplaar in de eendenkooi.

Pyrausta despicata – weegbreemot Gerard Bergsma

Op 18 augustus 2011 trof ik tijdens een inventarisatieronde (monitoringroute) op de Schaopedobbe bij Elsloo het dagactieve nachtvlindertje *Pyrausta despicata* aan. (foto blzd. 19).

Het is een lid van de familie van de *Crambidae*, oftewel de *Grasmotten*. Een zusje van deze soort is *Pyrausta aurata* - het *muntvlindertje*.

Pyrausta despicata is een algemene soort in Nederland met een spanwijdte tussen de 20 en 26 milimeter. Hij komt in elke provincie voor, maar naar het noorden toe



in mindere mate. Op een aantal Waddeneilanden is hij ook diverse keren gevonden; echter niet één keer op het vasteland van de provincie Friesland. Dit is dus de eerste waarneming van dit vlindertje op het vasteland van Friesland. Op Schiermonnikoog en in het Groningse deel van het Lauwersmeergebied komt *Pyrausta despicata* gewoon voor (waarnemingen: o.a. Gerrit Tuinstra). De vliegtijd loopt van mei tot half september in twee generaties. De rupsen leven in grote groepen (in een spinsel) aan de basis van bladeren van *Salvia* en Weegbreesoorten, vandaar de Nederlandse naam *weegbreemot*.