



Het laatste nieuws uit St.Nicolaasga Andy Saunders

Mesapamea secalella (vroeger *Mesapamea didyma*), weidehalmuiltje. Sinds 2000 heb ik alle *Mesapamea*'s die ik ving met de lichtval op de naam 'secalis' gebacht. Maar vorig jaar op 9 juli ving ik twee wat kleinere vlinders met een koperrode glans. Is het mogelijk dat deze vlinders *secalella*'s zijn en niet *secalis*, vroeg ik me af. Dus had ik de vlinders in een potje bewaard en ze tijdens de N.E.V. sectie Ter Haar bijeenkomst aan Rob de Vos gegeven.



M. secalella (det R de Vos)
(foto: A. Saunders)

Een week later door een e-mail van Rob, kreeg ik het nieuws dat beide vlinders inderdaad *Mesapama secalella* waren. Zo is er weer een nieuwe macro-soort voor St.Nicolaasga bij gekomen.



De tweede *M.secalella*. (det R de Vos)
(foto: A. Saunders)

Agriopsis leucophaearia, kleine voorjaarsspanner.

Op 25 februari 2010, na een lange periode slecht winter weer, was ik eindelijk weer het bos in vlinders om vlinders te zoeken. Ik kon niet meer wachten, ik moest het bos in, maar verwachtte niets. Langs het fietspad op de boomstammen van de

eik vond ik 126 mannetje's van de soort *Agriopsis leucophaearia*. Normaal vang ik 20 tot 30 vlinders gedurende het hele voorjaar. De vlinders waren allemaal op de zelfde tijd massaal uit de pop gekomen en op de boomstammen geklommen.



*Agriopsis
leucophaearia*
(foto: A. Saunders)

Interessante waarnemingen van kleine vlinders Gerrit Tuinstra

In dit artikel beschrijf ik in het kort de vangsten van verschillende soorten kleine vlinders, die ik in hoofdzaak in 2009 gedaan heb. Een aantal van de genoemde soorten zijn nog niet eerder in Friesland en/of het noorden van Nederland waargenomen.

Er is een toenemende belangstelling voor kleine vlinders. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de eenvoudige manier van communicatie via het internet, waarbij met een druk op de knop (digitale) foto's van vlinders verstuurd kunnen worden naar kenners, ter determinatie. Daarbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bepaalde soorten, in het bijzonder bij de kleine vlinders (microlepidoptera), vanaf een foto zeer moeilijk of niet gedetermineerd kunnen worden, vanwege grote gelijkenissen met andere soorten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan soorten uit het genus *Coleophora* (kokermotjes), die onderling sterk op elkaar lijken. Sommige soorten kunnen alleen aan de hand van bestudering van het genitaalapparaat van elkaar worden onderscheiden! Maar ook de herkenning van de – over het algemeen wat gemakkelijker herkenbare – Tortricidae (bladrollers) is soms nog behoorlijk lastig.