

gebied, goed uitziet. Dat er hier sprake is van een incidentele opleving lijkt ons evident. De tijd zal ons leren in hoeverre het Veenhooibeestje zich werkelijk herstelt.

Bijzondere waarnemingen in 2000. Jannie Sinnema

Opvallend was het aantal binnengekomen waarnemingen van de Gehakkelde Aurelia (*Polygonia c-album*): bijna 100 exemplaren. Op enkele plaatsen werden zelfs 4 vlinders tegelijk op de Herfstasters gezien. Ook zijn er rupsen gevonden en opgekweekt. Na de uitgave van Dagvlinders in Fryslan kunnen we alweer enkele nieuwe vindplaatsen toevoegen zoals Dokkum en Damwoude. In 2000 zijn ook twee nieuwe vindplaatsen van de Kommavlinder (*Hesperia comma*) vastgesteld: op 23 juli en 12 augustus in het Fochtelooërveen en op 11 augustus in Wijnjewoude. Op 13 augustus werd een Koninginnepage (*Papilio machaon*) in Heerenveen waargenomen. De tweede melding van deze mooie dagvlinder kwam uit Nijeberkoop op 29 augustus.


Van de trekvlinders waren de Atalanta's (*Vanessa atalanta*) volop te bewonderen, terwijl de Distelvlinders (*Vanessa cardui*) zich slechts af en toe lieten zien. Meestal worden de Luzernevlinders op de Waddeneilanden gesignaleerd. Dit jaar waren er ook meldingen van de Oranje Luzernevlinder (*Colias croceus*) uit Menaldum, Leeuwarden en Joure. Ook zijn er meldingen van enkele pijlstaarten onder de trekvlinders. De Onrust of Kolibrievlinder (*Macroglossum stellatarum*) is gezien in Lemmer, Hemrik en Damwoude. De Windepijlstaart (*Agrius convolvuli*) is waargenomen in Ternaard (twee exemplaren) en Harlingen. De Doodshoofdvlinder (*Acherontia atropos*) werd gemeld uit Ternaard, Hallum en Oosterwolde.

Tijdens de excursie van de Secties Ter Haar en Snellen in Bakkeveen en het Blauwe Bos bij Haule is het voorkomen van 157 soorten microvlinders en 216

soorten macrovlinders vastgesteld. Hieronder bevonden zich 9 micro-soorten die nog niet eerder in Friesland zijn aangetroffen. Nieuw voor Friesland waren: *Argyresthia sorbiella*, *Coleophera trifolii*, *Coleophera zelleriella*, *Scythris ericivorella*, *Monochroa suffusella*, *Bryotropha galbanella*, *Sophronia semicostella*, *Anarsia spartiella* en *Dioryctia schuetzeella*.

In het Fochteloërveen ving Gerrit Tuinstra op 25 augustus een nieuwe spanner voor Friesland: *Castaconvexa polygrammata*. Volgens de catalogus van Lempke komt de vlinder in Noord-Brabant en Limburg voor. De rups leeft op Walstro. Deze spanner is in 2000 ook aangetroffen in de Achterhoek door Jaap Zwier.

Andere bijzondere waarnemingen van nachtvlinders staan beschreven in het artikel over de inventarisatie van de Duurswouderheide.



Castaconvexa polygrammata
Ongewone vlinderkweek Wilma Trumpie

Het is juni. Hé, in de bladeren van de geranium op de keukenvensterbank zitten gaten. En op de vensterbank liggen kleine zwarte korreltjes die wel op rupsenpoepjes lijken. Na goed zoeken ontdek ik drie hele kleine felgroene rupsjes, dezelfde kleur als het geraniumblad, in elke geranium één. De rupsjes groeien voorspoedig. Ze weten zich goed te camoufleren, want elke dag moet ik zoeken om ze te vinden. Op een dag is er één niet meer te vinden. De andere twee zitten in dezelfde geranium. Een paar dagen later tijdens de afwas: wat heb ik nu voor groens in mijn sop? Het blijkt een rups te zijn, jammerlijk verdronken.

Begin juli verkleurt de laatste rups naar beige en krijgt een patroon van omgekeerde v-vormige streepjes op de rug. Vanaf 7 juli gaat hij 's nachts geregeld aan de wandel en vind ik hen de volgende morgen op verschillende plaatsen op het aanrecht terug. Elke keer zet ik hem op de geranium terug. Ik denk dat hij een plekje zoekt om te verpoppen. Omdat ik in de boeken niet kan vinden wat voor rups het is, weet ik ook niet welke omstandigheden hij daarvoor nodig heeft. Op 13 juli heb ik hem maar in een pot met gaatjesdeksel gedaan. Van de toegediende geraniumblaadjes eet hij nauwelijks. Gaat hij dood? Nee, toch niet. Op 26 juli heeft de rups zich 's nachts verpopt. En dan, op 16 augustus wordt onze

