

Ook deze soort is dus niet erg algemeen in Friesland.  
De soort is op 12 mei 1999 in Ureterp gevangen (Tuinstra).

### **Choreutidae.**

#### *Choreutis pariana* (Clerck, 1759)

Een interessante soort is *C. pariana*. Kuchlein vermeld één vindplaats van deze soort in Friesland: Leeuwarden 1859. Gerard Bergsma vangt de soort 132 jaar later in Appelscha, dit is de tweede waarneming van de soort in Friesland. Vervolgens werden in 1994 twee exemplaren gevangen op Terschelling, Midsland (25 februari en 28 mei, Jaarverslag 1994).

Afgelopen jaar bleek dat reeds op 18 juli 1998 een exemplaar van de soort gevangen was gevangen in Jubbegea (Tuinstra).

Het betreft hier de vierde vindplaats van de soort in Friesland.

### **Pyralidae.**

#### *Agriphila deliella* (Hubner, 1813)

Deze pyralide is uitsluitend bekend van de waddeneilanden (volgens Kuchlein en de jaarverslagen). Tijdens de excursie in het Aekingerzand, op 22 augustus 1999, ving Jannie Sinnema een exemplaar van deze soort.

**De eerste vindplaats van de soort op het Friese vaste land.**

*Adres auteur:*        *Korte Baan 20*  
                              *9201 HP Drachten*

### **Gouden Vlinder voor Jacob Bijlsma    Siep Sinnema**

Zoals jullie waarschijnlijk al in de krant hebben gelezen of op TV-Friesland hebben gezien heeft boswachter Jacob Bijlsma uit Broeksterwoude op zaterdag 4 maart 2000 de jaarlijkse Gouden Vlinder van de Vlinderstichting uitgereikt gekregen. Jacob Bijlsma heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn inspanningen om de Zilveren Maan in de Houtwiel te beschermen. De Zilveren Maan hoort van oudsher thuis in het gebied van de Houtwiel; door het veranderde beheer van het natuurgebied wordt de soort hier echter bedreigd. Het natuurgebied heeft een eigen waterhuishouding, die los staat van de boezem en moet volgens de uitgangspunten van Staatsbosbeheer zijn eigen gang gaan. Maar zonder ingrijpen zou het gebied sterk verruigen en dat zou ten koste gaan van deze kritische bewoner van het natte schraal- en blauwgrasland. De waardplant van de Zilveren Maan is namelijk het Moerasviooltje; alleen op deze plant zet de vlinder in dit gebied zijn eieren af. Zonder ingrijpen zou het gebied zodanig verruigen, dat het Moerasviooltje weinig kans meer heeft. Door kleinschalige ingrepen in het beheer, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar maaien, wordt dit laatste voorkomen. Het is

Jacob Bijlsma gelukt om deze speciale beheersmaatregelen voor elkaar te krijgen, waardoor de Zilveren Maan weer een betere kans krijgt om in dit gebied te overleven. Het Houtwiel behoort samen met de Wieden en de Weerribben tot de belangrijkste leefgebieden van de Zilveren Maan. In heel Nederland zijn waarschijnlijk nog maar een tiental populaties over. In Friesland zit o.a. ook nog een populatie in de duinen van Terschelling. Op het vasteland neemt het aantal geschikte leefgebieden zienderogen af. Daar komt nog bij, dat de populaties behoorlijk geïsoleerd leven van elkaar. Een oplossing zijn om de verbindingszones tussen de terreinen te maken, zodat een uitwisseling tot stand kan komen. We feliciteren Bijlsma met de onderscheiding en wensen hem veel succes bij de verdere bescherming van de biotoop van de Zilveren Maan.

### **Verslag Vlinderwerkgroependag Gerard Bergsma**

Op zaterdag 22 januari 2000 was de Vlinderwerkgroep Friesland, tezamen met de andere Nederlandse vlinderwerkgroepen, door de Vlinderstichting en de Vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland uitgenodigd voor de jaarlijkse werkgroependag in Duincentrum de Zandwaaier in de Kennemerduinen vlakbij Overveen. Onze werkgroep was hierbij vertegenwoordigd door Jannie Sinnema en Gerard Bergsma. Om 10.00 uur startte het programma met een welkom door Jan van der Made, directeur van de Vlinderstichting en een inleiding door Mariëk Eggenkamp, bestuurslid van de Vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland, die een overzicht gaf van de activiteiten van hun werkgroep in dit prachtige duingebied. Veel werkgroepleden lopen er monitoringroutes. Ook gaf ze enkele bijzonderheden van bepaalde dagvlinders in hun doelgebied, zoals de ontdekking van hun werkgroep, dat de Aardbeivlinder (*Pyrgus malvae*) ter plaatse zijn eitjes legt op dauwbraam (*Rubus caesius*), tot dan toe een onbekend verschijnsel. Tevens is door hen geconstateerd, dat het Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) daar zijn eitjes ook legt op Ruige scheefkelk (*Arabis hirsuta*) en hebben zij de achterliggende jaren vastgesteld, dat de populatie van het Koevinkje (*Aphantopus hyperantus*) zich in zuidelijke richting van dit omvangrijke natuurgebied verplaatst (migreert).

Onderzoek en advies. Chris van Swaay komt hiervoor aan het woord. Hij vertelt, dat er een nieuwe landelijke dagvlinderatlas (opvolger van "Tax") in voorbereiding is, die over 2 à 3 jaar het licht zal zien. 2000 zal vrijwel zeker het laatste inventarisatiejaar zijn. Ook een aantal provinciale verspreidingsatlassen zullen in de komende jaren verschijnen, te beginnen met Friesland en Limburg (al in 2000). Op basis van de gegevens in deze atlassen kunnen Milieueffectrapportages (MER's) worden vervaardigd. Verder deelt hij mee, dat er een boekje "10 jaar dagvlindermonitoring" is verschenen. Hierin worden twee veranderingen aangegeven, namelijk: 1<sup>e</sup>) Het jaar 1950 moet (op instigatie van het Ministerie van LNV) op 100 worden gesteld. Dit is het nieuwe referentiekader. Na 1950 begonnen zoals bekend de grote veranderingen (o.a. ruilverkaveling,