

Excursie Staniastata en Griekse en Turkse Bosjes

Het is bepaald geen vlinderweer als we op 8 mei 's middags om twee uur aankomen bij Staniastate, vlakbij Oenkerk. Er staat een straffe noordwestenwind, maar gelukkig laat de zon zich regelmatig zien. We hebben onze hoop gevestigd op luwe plekjes in deze bosrijke omgeving. Ook Andy Saunders, Willem de Jong, Doeke Stienstra, Luut de Zee en Marten, Henk en Auke Hunneman hebben zich niet door de koude wind laten afschrikken en verzamelen zich op een parkeerterrein richting Molenend. Deze parkeerplaats ligt aan de oostkant van Staniastate en dus enigszins in de luwte. We zien vlakbij de auto's dan ook al snel een aantal dagvlinders: het Landkaaartje, Oranjetipje, Klein geaderd witje en Groot koolwitje. Zoiets geeft de burger moed en het veldje wordt verder afgestruind. Op de Pinksterbloemen aan de rand van het veldje vinden we eitjes van de Oranjetip. Tijdens de excursie van vorig jaar in het Katlijker Schar hadden we een bijzondere micro waargenomen, namelijk *Adela rufimetrella*, een kleine langsprietmot. En ook hier vinden we op de Pinksterbloem een aantal exemplaren van deze fraai gekleurde micro; hij was nog niet bekend van dit gebied. Ook een meer bekende langsprietmot, namelijk *Adela reaumurella* wordt gezien, evenals rupsen van de Grote wintervlinder (*Erannis defoliaria*).

Omdat in Staniastate zelf weinig onderbegroeiing te vinden is besluiten we onze excursie te richten op de Griekse en Turkse bosjes. Dit zijn van oorsprong eikenhakhoutbosjes, waarin in de loop der tijden een aantal paden is ontstaan. De nogal exotische naam van deze bosjes zou afkomstig zijn van de verkoop van staatsobligaties aan Griekenland en Turkije, waarmee de familie Van Sminia de aanleg van deze bosjes bekostigde.

Onderweg zien we aan de voet van dikke eikenstammen honderden "zakjesdragers" zitten, die kennelijk de algen op de vochtige stammen consumeren. Als we in de Griekse en Turkse Bosjes zijn gearriveerd blijken ook daar de stammen vol te zitten met deze kokertjes. We hebben geen idee welke zakjesdrager het hier betreft en achteraf klopt dat ook wel. Het blijken namelijk de larven te zijn van een schietmot, die niet in het water leeft, maar inderdaad op vochtige boomstammen. De oogst aan dagvlinders is niet erg groot: we zien in de boslaantjes nog een tiental Bonte zandoogjes, een Oranjetip, een Klein geaderd witje, een Groot koolwitje, een Dagpauwoog en een Boomblauwtje. Op Lijsterbes wordt nog een rups van de spanner *Hemitea aestivaria* waargenomen, terwijl in de onderbegroeiing een rups van de Grote beer (*Arctia caja*) wordt gevonden. Tenslotte zien we nog twee nachtvlinders tegen de bomen zitten: het spannertje *Acasis viretata* en *Hydriomena impluviata*. Ook de microliefhebbers komen toch nog aan hun trekken, want we kunnen een derde soort langsprietmot begroeten, namelijk *Adela swammerdamella* en we zien *Incurvaria masculella*.

Om een uur of vier besluiten we huiswaarts te keren; ondanks het ongunstige weer hebben we toch nog kunnen genieten van een redelijk aantal vlinders.

Siep Sinnema