



Foeragerende 'Witkopgrutto', Opperdoes - Twisk - 14 mei 2021 | Harry de Kleine

Opvallende waarnemingen buiten onze regio 'Nieuwe ondersoort' van de Grutto tussen Opperdoes en Twisk: de Witkopgrutto!

Harry de Kleine

Op 14 mei van dit jaar bracht ik met mijn vogelmaatje Sjaak Ketelaar een dagje door rond het Balgzand bij Den Helder. Van een plaatselijke vogelaar kregen we een tip over een aantrekkelijk nieuw vogelgebiedje tussen Opperdoes en Twisk. Omdat het mooi op onze route naar huis lag, zijn we er gaan kijken. Het bleek te gaan om een groot wateropslaggebied. Dit zag er aantrekkelijk uit met een lappendeken van weilandjes en plasdrasgebiedjes met de bijbehorende

slikrandjes. We zagen er veel broedende Kluten en verder Bergeenden, Kleine Plevieren, Grutto's, Tureluurs en Scholeksters. In een bloemrijk weilandje pikte ik een opvallende Grutto op. De vogel had een lichte kop en viel daardoor meteen op. Ik heb er wat plaatjes van gemaakt en is dit mijn eerste deels leucistische¹ Grutto. Het zou interessant zijn als ook andere vogelaars deze 'Witkopgrutto' ergens spotten.



Detail van de leucistische Grutto
| Harry de Kleine

¹ Leucisme veroorzaakt de aangeboren afwezigheid van pigment producerende cellen. De als gevolg daarvan witte veren zijn al aanwezig in het eerste jeugdkleed en dat aantal verandert niet wanneer de vogel ouder wordt. Leucisme kan totaal zijn (helemaal wit) of gedeeltelijk (bont).