



Gewone pad bezig met beklimming van een knotwilg.

in de ogen. Roerloos zit 'ie tegen de kaarsrechte stam geplakt, als een rotsbeklimmer peinzend over de volgende greep. Ik maak een foto, registreer het voorval als een leuke toevaligheid en vervolg mijn weg.

Enkele avonden en tellingen later, 11 oktober 2020. Zelfde ervaring: 'flits!' Pad op de boom! Inwendig geef ik mezelf een standje. Had ik mezelf niet aangeleerd dat dingen die je als 'toevaligheid' ervaart in de natuur zelden een toevaligheid zijn? Ik stap van de fiets begin de knotwilgen langs te lopen. Binnen een paar minuten vind ik er nog drie: één klimmend en twee op enige hoogte in een holte, waar ik ook nog een bruine kikker vind. Het is al laat, morgen verder kijken.

12 oktober 2020. Systematisch vanaf de weg geteld kom ik aan in totaal 8 padden, bolderend op een boomstam. Ook de kikker en de twee padden zitten nog in hun holte, dus dat maakt 11. De weg blijkt geflankeerd te worden door 378 stammen van vooral knotwilgen, waarvan er die avond dus minstens 3% door padden beklommen werden. Vermoedelijk meer, want de achterkant van de stammen heb ik niet gezien.

Bij wijze van gedachtenexperiment maak ik het volgende sommetje: het gemiddeld aantal slachtoffers onder de gewone pad in de periode augustus tot en met oktober was vier per avond voor elke maand (om precies te zijn: 37, 16 en 36 slachtoffers in respectievelijk augustus, september en oktober verdeeld over 9, 4 en 9 avonden). Twaalf oktober was een 'gemiddelde' avond, met eveneens vier verkeersslachtoffers onder de gewone pad. Daarmee neem ik aan dat 10 padden op een knotwilg representatief is voor het gemiddeld aantal 'knotwilgpadden' op één avond op dit traject in dit seizoen. Op een heel najaar zou dat betekenen dat ongeveer 1.000 padden hier kans maken om ergens in een knotwilg te eindigen.

Discussie

Hoeveel padden er daadwerkelijk in de knotwilg eindigen en vervolgens ook blijven/overwinteren, weet ik niet. 13 oktober

Paddenvlieg onder de loep

RAVON doet in samenwerking met diverse onderzoeksinstituten onderzoek naar diverse aspecten van de ecologie, taxonomie, verspreiding en habitat van de groene paddenvlieg (*Lucilia bufonivora*). Dit vliegje parasiteert uitsluitend op amfibieën en voor menig natuurliefhebber een bekende (en gevreesde) verschijning in de zomermaanden. In de aankomende jaren wordt dit onderzoek voortgezet. Voor het aankomende seizoen zoeken wij studenten voor twee verschillende onderzoeken:

- Het eerste onderzoek betreft een desktopstudie (GIS-analyse) naar de verspreiding van de soort in Nederland. Specifiek wordt gekeken naar welke aspecten, van klimaat, bodemtypes tot vegetatie het voorkomen van de paddenvlieg beschrijft en voorspelt. De beoogde stagiaire is idealiter een Masterstudent (biologie) met een specialisatie GIS en/of Bioinformatica.
- Het tweede onderwerp behelst een onderzoek naar de verschillende gastheren van de groene paddenvlieg in Nederland. Veldwerk is zeer een belangrijke component van deze studie (medio juni – begin september). HBO en MBO- niveau 4 studenten van diverse groene opleidingen kunnen op dit onderwerp solliciteren.

Interesse om als stagiair in de wereld van dit gruwelijke maar fascinerende vliegje te duiken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Tariq Stark (t.stark@ravon.nl). Meer info:

www.ravon.nl/Over-RAVON/Stages/ziektes-en-parasieten



Paddenvlieg. (Foto: Tariq Stark)

vertrok ik naar het buitenland om pas half december weer terug te komen. Tegen die tijd kon ik geen padden meer vinden. Wel nog bruine kikkers, gemiddeld drie slachtoffers per avond (20 verdeeld over zes avonden in december), maar geen enkele op een boomstam. Padden in bomen zijn vaker beschreven. Onder andere Bringsøe (2016) geeft hiervan een overzicht. Gosá (2003) beschrijft 129 vondsten van gewone padden in bomen in Noord-Spanje op gemiddeld 39 cm hoogte, tot maximaal 1,97 meter. Hij schrijft verder dat klimactiviteit 'schaars' was in het natte seizoen (maart tot begin juni) en zich voornamelijk afspeelde in het natte seizoen (september-oktober). Wat de verklaring ook moge zijn, het zou kunnen dat klautergedrag vooral een najaarsactiviteit is. Geen onbekend verschijnsel dus, maar als leek op het gebied van amfibieën was ik me niet eerder bewust van de betrekkelijke massaliteit van het fenomeen. Hoe de pad kan overleven in een landschap dat constant gemaaid en geschoond wordt is voor mij in een nieuw daglicht komen te staan. Mogelijk zijn er lezers die ook nog niet zo bekend waren met de 'knotwilgpadden' en het leuk vinden om er eens op te letten.

Literatuur

- Bringsøe, H. 2016. Two cases of height-seeking behaviour in the Common Toad, *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), in Denmark. *Mertensiella* 24: 146-149.
- Gosá, A. 2003: *Bufo bufo* (Common Toad), *Alytes obstetricans* (Midwife Toad), and *Rana temporaria* (Common Frog). *Tree Climbing. Herpetological Review* 34: 355.

Tekst en foto's: Bram Koese

bram.koese@naturalis.nl