

Een afwijkend gekleurde Middelste Bonte Specht in het Gooi

R.G. (Rob) Moolenbeek

In De Korhaan van winter 2021-22 pagina 34 schreef ik met Jurriën Uiterwijk (Uiterwijk & Moolenbeek, 2021) over het voorkomen van de Middelste Bonte Specht in ons werkgebied. Dit naar aanleiding van prachtige foto's van Jurriën over het mannetje dat al enige tijd waargenomen wordt op het landgoed Crailo in Huizen.

Natuurlijk had ik de foto's gezien maar nu ze paginagroot werden afgebeeld viel mij direct op dat dit geen gewone Middelste Bonte Specht was. Hij miste de zo karakteristieke donkere streepjes op zijn flanken. Ook 2/3 van de buitenste staartpennen was egaal wit (zie foto Uiterwijk & Moolenbeek, in Korhaan van winter 2021-22) terwijl die normaal bij alle bonte spechten zwart-wit gevlekt zijn. Ook de witte vlekken op de arm- en slagpennen lijken groter dan normaal. De anaalstreek is mogelijk iets lichter rood van kleur dan gebruikelijk.

Ik legde dit gegeven voor aan Kees Roselaar (ornitholoog bij Naturalis) en hij antwoordde mij direct terug dat dit ook hem op 14 maart 2021 was opgevallen. Hij was toen naar het Gooi gefietst om deze specht te bekijken en maakte hier toen de volgende melding van op waarneming.nl: "aanvliegend uit ZO, even roepend bij landing, foeragerend hoog in takken; toen even later een Havik langs kwam slaakte hij een alarmroep, zakte omlaag en drukte zich aan mijn kant tegen dikke stam aan (Havik verder weg boven bomen aan andere kant), dus prachtig te bekijken; daarna weer hoger op zijtakken van boomkruin foeragerend; heel veel wit in vleugel, bijna als *Dendrocopos leucopterus* (Witvleugelspecht), veel meer dan Grote Bonte en standaard Middelste, maar Middelste van Gravenallee (Almelo) in 2010 had ook zoveel; wel tamelijk aberrant door vrijwel ontbreken van donkere strepen op flank en weinig rood op buik, daardoor op *D. assimilis* (Tamariskspecht) lijkend; mooi rood glimmende kruin en contrasterend zwarte nape, dus man."

Cramp et al. (1985: 891) vermeldden dat de streepjes op de flanken soms bleek grijs

kunnen zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de 4de en 5de staartpen soms grotendeels wit met weinig zwarte vlekken zijn. In Glutz von Blotzheim (1980) kon ik niets over afwijkend gekleurde mibo's vinden. Het zou interessant zijn om foto's van de overige in het Gooi waargenomen Middelste Bonte Spechten te bekijken. Is het exemplaar uit Crailo een uitzondering of komt het vaker voor bij 'onze' Gooise Mibo's?

Vermeldenswaardig is nog de waarneming van twee broedgevallen op de 's-Gravelandse landgoederen door Jan Mooi (2021). Zijn dit de eerste vastgestelde broedgevallen in het Gooi?

Bronnen

- Glutz von Blotzheim, U.N., K.M. Bauer, 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 9. Aula Verlag.
- Cramp, S. et al., 1985. Handbook of the birds of Europe the Middle East and North Africa. Volume IV, Terns to Woodpeckers. Oxford University Press, Oxford.
- Glutz von Blotzheim, U.N., 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9. Columbiformes – Piciformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Mooij, J., 2021. Broedvogels van Schaep en Burgh, Boekesteijn en Bantam 2021. Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, rapportnummer 303: 1-32.
- Uiterwijk, J. & R.G. Moolenbeek, 2021. De Middelste Bonte Specht in het Gooi en omstreken. De Korhaan 55(4): 34-36.
- Waarneming.nl, 14 maart 2021 Middelste Bonte Specht, C. Roselaar.



Het afwijkend gekleurd mannetje Middelste Bonte Specht, Crailoo, Huizen, april 2021 | Jurriën Uiterwijk

