



● Rietland met zomerklokje.
Foto: Theo Baas.

Rietlanden met zomerklokje

Rietlanden met zomerklokje horen in vegetatiekundig verband tot de klasse van natte strooiselruigten. Dit zijn hoog opschietende bloemrijke vegetaties van natte, stikstofrijke standplaatsen met soorten als gewone en grote engelwortel, echte valeriaan, gele lis, koninginnenkruid, moerasandoorn, haagwinde, smeewortel, speenkruid, dotterbloem en tal van andere soorten. Natte strooiselruigten met zomerklokje komen uitsluitend voor op buitendijks gelegen rietlanden (soms buitendijks gelegen venige hooilandjes) die in het winterhalfjaar regelmatig overstromen. In ons land zijn natuurlijke groeiplaatsen beperkt tot het Zuid-Hollandse rivierengebied en het stroomgebied van de Vecht in Utrecht en Noord-Holland. Een uitzondering is een semi-natuurlijke groeiplaats langs het Kanaal Omval-Kolhorn bij Alkmaar die al in 1967 genoemd wordt. Deze groeiplaats

vindt haar oorsprong waarschijnlijk in de aanvoer van rietzoden vanuit Zuid-Holland, omdat er naast zomerklokje ook veel bittere veldkers groeit. Die combinatie is typisch iets van het Zuid-Hollandse rivierengebied.

Beheer

Rietlanden met zomerklokje worden over het algemeen een keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Soms is er sprake van een rietcultuur waarbij het riet jaarlijks wordt geoogst.

Bedreigingen

Zomerklokje is in ons land nooit algemeen geweest maar gerekend vanaf 1950 is er sprake van een achteruitgang van 25% tot 50%, waardoor de soort nu echt zeldzaam is geworden. Veel natuurlijke groeiplaatsen zijn verdwenen door erosie van oevers door toegenomen scheepvaart, het

aanspoelen van onverteerbaar afval en stadsuitbreidingen.

Zomerklokje buiten de natuurlijke groeiplaatsen

Buiten de natuurlijke groeiplaatsen komt zomerklokje verspreid binnen Noord-Holland voor. Het is een geliefde tuinplant die regelmatig wordt aangeplant, onder andere op landgoederen en langs waterkanten. Soms kan ze lang standhouden maar van uitbreiding is meestal geen sprake omdat de zaden in natuurlijke omstandigheden door het water worden verspreid - de zaaddozen kunnen een tot twee maanden blijven drijven. Anders dan de naam doet vermoeden valt de bloeitijd van zomerklokje overigens niet in de zomer maar halverwege de lente.

Theo Baas
baas0828@planet.nl