

Eerste broedgevallen van inheemse Grauwe Ganzen in Noord-Brabant

De Grauwe Gans komt als broedvogel in Nederland voornamelijk voor in de Flevopolders, het zuidwesten van Friesland en Zeeland. Het totaal aantal broedparen werd voor 1977 geschat op 100-150 (Teixeira 1979). De vogels, die in Nederland van nature broeden, behoren tot de ondersoort anser. Deze ondersoort onderscheidt zich van de ondersoort rubrirostris door een kleinere, oranje snavel (rubrirostris: roze), minder wit in het kleed en een iets kleiner formaat (Cramp et al. 1977). De in Zeeland broedende vogels zijn afkomstig van het Zwin in België, waar in plaats van anser de niet-inheemse ondersoort rubrirostris is uitgezet. Ook de broedgevallen in de Biesbosch betreffen deze ondersoort. Buiten de Biesbosch werden, voor zover bekend, tot 1981 geen broedgevallen van Grauwe Ganzen vastgesteld in Brabant. In het voorjaar van 1980 viel het al op, dat op de vennen en plassen te Budel-Dorplein (gemeente Budel) enkele Grauwe Ganzen lang verblijf hielden. Ook in 1981 was dit het geval: in maart en april werden geregeld 1 of 2 vogels (anser) gezien en op 2 mei zelfs 5. Er werd reeds gehoopt op een broedgeval, hetgeen gezien het open karakter van het gebied met plassen en rietvegetaties niet onmogelijk leek. Toch was het een verrassing, toen op 5 mei twee paren met elk 5 jongen en een derde paar zonder jongen werden waargenomen. Afgaande op de leeftijd van de jongen (ca 2 weken) moeten de eieren in de eerste week van april gelegd zijn. Van het paar zonder jongen, dat direct opvloog, kon de ondersoort niet bepaald worden. Eén der paren met jongen betrof een "mengpaar" van anser x rubrirostris; het andere paar met jongen betrof twee ansers, i.e. "inheemse" Grauwe Ganzen. Dit betreft het eerste broedgeval van inheemse Grauwe Ganzen in Noord-Brabant. Bovendien is nog nooit het broeden van Grauwe Ganzen (ongeacht anser of rubrirostris) zo ver in het Nederlandse binnenland geconstateerd. Het blijft echter een open vraag, of de inheemse vogels echt wild zijn. In de Ooypolder onder Nijmegen zijn bijv. ansers uitgezet, waar ook enkele broedgevallen zijn vastgesteld.

Cramp, S. et al. 1977. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. 1. Oxford Univ. Press, Oxford.

Teixeira, R.M. (red) 1979. Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Natuurmonumenten, 's-Graveland.

Tom Heijnen.

Topografische kaartenatlas

Speciaal ten behoeve van mensen, die zich bezig houden met inventarisatiewerk in het kader van verspreidingsonderzoek aan planten en dieren, publiceert het Staatsbosbeheer samen met de Topografische Dienst dit voorjaar een kaartenatlas, waarin alle topografische kaarten van Nederland zijn opgenomen. Het betreft de kaarten van schaal 1 : 50.000, welke fotografisch verkleind zullen worden tot 1 : 80.000 teneinde een