

EERSTE BROEDGEVALLEN VAN INHEEMSE GRAUWE GANZEN IN NOORD-BRABANT?

Naar aanleiding van het artikeltje in de vorige Roodborsttapuit (nr. 1, 1981) van Tom Heijnen heb ik enkele aanvullingen opgezocht omtrent het broeden van Grauwe Ganzen in de provincie Noord-Brabant. Zoals bekend is de Biesbosch het belangrijkste broedgebied van de Grauwe Gans in Noord-Brabant. In de loop van de zeventiger jaren is de soort hier een min of meer regelmatige broedvogel geworden (aanvankelijk uitgezet) met vooral de laatste jaren vaak meer dan één paartje. Helaas is er weinig bekend over de ondersoort waartoe deze ganzen behoren; het is echter waarschijnlijk dat met name de eerste jaren vooral 'rubrirostris' ganzen hebben gebroed (helaas was het ook deze ondersoort die hier werd uitgezet). Later konden echter ook één of twee broedgevallen van 'anser' ganzen worden vastgesteld, terwijl ook mengparen van beide ondersoorten wel werden waargenomen, waardoor het onderscheiden van beide rassen in sommige gevallen een zeer moeilijke zaak is geworden.

Ook in 1981 tenslotte kon er in de Brabantse Biesbosch tenminste één succesvol broedgeval van Anser anser anser worden vastgesteld. Behalve deze broedgevallen in de Biesbosch heeft de soort volgens betrouwbare mededelingen van een plaatselijke jachtopzichter rond 1978 ook nog gebroed op het toen in ontwikkeling zijnde industrieterrein Moerdijk te Klundert; hierbij werd helaas niet op de ondersoort gelet, doch 'ander' is, gelet op aard en ligging van dit terrein zeker niet uitgesloten.

Wat de broedgevallen te Budel-Dorplein betreft kunnen de volgende waarnemingen worden toegevoegd:

10 jan 1981	17 exemplaren fouragerend,
7 feb 1981	12 exemplaren fouragerend,
8 mrt 1981	6 exemplaren fouragerend,
30 mei 1981	1 paartje met 5 jongen; 1 paartje met 4 jongen en 1 paartje met 2 jongen, resp. 3, 4 en 5 weken oud,
4 jul 1981	1 paartje met 4 jongen en 1 paartje met 3 jongen, waarvan 1 'bont' exemplaar.

Hieruit blijkt dus dat er 3 paren met succes hebben gebroed; ook blijkt hieruit dat deze vogels omstreeks begin april met het broeden zijn begonnen.

In het artikel van Tom werd verder zeer terecht de vraag gesteld of het hier wel om wilde vogels gaat. Deze vraag moet waarschijnlijk ontkennend worden beantwoord, omdat van de op 4 juli waargenomen jongen er één opmerkelijk bont gekleurd was. Bovendien werd na het broedseizoen vernomen dat er in de winter in het Belgische Hamont (op ca 3 kilometer afstand) een aantal vogels ontsnapt zijn waaronder o.a. een groep van ca 20 Grauwe Ganzen.

Op grond van deze feiten lijkt het me waarschijnlijk dat de 3 paren Grauwe Ganzen die in 1981 te Budel-Dorplein hebben gebroed geen wilde exemplaren zijn geweest.

Ad van Poppel, Scarlattistraat 108, 5049 GC Tilburg.