

In vergelijking met de door Tom vastgestelde aantallen wekken de door mij verzamelde gegevens inderdaad de indruk, dat ook in Noord-Brabant de najaarstrek veel sterker is dan de voorjaarsstrek: in het najaar gemiddeld 8,0 Paapjes en 5,0 Tapuiten per 100 ha tegenover respectievelijk 1,1 en 2,4 in het voorjaar. Maar dit slechts ter illustratie: een vergelijking is op deze manier natuurlijk niet goed mogelijk, de gemiddelden zijn immers op heel verschillende manieren gevonden!

Literatuur

Heijnen, T. 1982. Over de doortrek van Paapjes en Tapuiten in de Kempen in mei 1982. Roodborsttapuit 1(3): 32-34.

Voorts diverse streekavifauna's.

Adres: Jeroen Boschstraat 18, 5062 LE Oisterwijk.

STERKE NAJAARSTREK VAN PAAPJES IN DE KEMPEN

Naar aanleiding van het artikel "Over de doortrek van Tapuiten en Paapjes in mei 1982 in de Kempen" door Tom Heijnen (Roodborsttapuit 1(3): 32-34) volgt hier een interessante aanvulling, maar dan uit het najaar.

Op 10 september 1978 ontmoette ik aan het Goorven te Lage Mierde Marco Bakermans en Jasper Jan de Koninck. Ieder was opgevallen dat er die dag opvallend veel Paapjes te zien waren. Al tellende kwamen we tesamen aan een totaal van 66 exemplaren. Tevens had ik die dag 16 Roodborsttapuiten en 2 Tapuiten waargenomen. Van beide andere waarnemers zijn me de aantallen van deze soorten ontgaan. Er was niet systematisch geteld. Hoogstens werd die dag wat meer op Paapjes gelet vanwege z'n opvallend talrijke voorkomen.

In ogenschouw genomen dat men een Paapje tot op 100 meter herkent of überhaupt nog opmerkt, kan een minimale dichtheid berekend worden. Tot het Goorven bedroeg de afstand die we gezamenlijk door cultuurland hadden afgelegd ongeveer 20 km en daarmee de getelde oppervlakte op circa 400 ha. Dit zou betekenen, dat de dichtheid voor dat gebied op die dag minimaal liefst $16\frac{1}{2}$ exemplaren / 100 ha bedragen heeft.

Lex Peeters, Marialaan 26, Reusel.