

# VELDWERK




## WINTERWAARNEMING VAN EEN DWERGGORS

Op 9 februari 1986 zagen wij 's morgens, om precies te zijn om 11.25 uur, in het natuurreservaat "De Grote Peel" een gors aan de kant van een droge veenvaart zitten. Deze gors was zo weinig schuw dat wij deze tot op een afstand van circa 8 meter konden naderen.

De gors bleef gedurende enige tijd op de grond en zocht naar voedsel (vooral het zaad van het pijpestrootje).

Doordat we naderbij kwamen om deze gors beter in de kijker te krijgen, vloog deze op en ging enkele meters verder in een struik zitten. Bij het opvliegen maakte deze gors een geluid dat we het best kunnen omschrijven als een kort en scherp tjip, tjip, tjip.



Dwerggors

- \* Tikkeltje gedrongen, heggemusachtig postuur + gedrag
- \* 'tik'-roep als Appelvink
- \* Puntige vaak opgewipt lijkende snavel ( $\pm$  rechte bovensnavel)
- \* meestal duidelijke, lichte oogring.
- \* nogal 'bloom' gezicht omdat voor het oog donkere strepen ontbreken
- \* opvallende donkere driehoek van wang-begrenzing
- \* onderzijde witachtig. Borst duidelijk afgetekend en scherp gevlekt
- \* geen opvallende vleugelvleek

Toen we de gors onder goede belichting waarnamen viel ons direkt de markante koptekening op. Mede door het geluid dat ons niet vertrouwd in de oren klonk dachten we aan een Dwerg- of Bosgors.

De gors werd ongeveer anderhalf uur geobserveerd en later gefotografeerd. Daarbij werden de volgende notities gemaakt:

Beschrijving (uitgewerkt aan de hand van in het veld gemaakte aantekeningen).

Grootte: ongeveer als Kneu, opvallend kleiner dan Rietgors.

1 KOP: kruin zwartbruin, kruinstreep - roestbruin met zeer fijne zwarte streepjes, oog - zwartbruin, oogring - wit, wenkbrouwstreep - roomkleurig, teugel - kastanje roodbruin, oorstreek - kastanje roodbruin, zwart omljnd, baardstreep - onduidelijk zwart, keel - wit, snavel - zwartbruin, bovensnavel recht, enigzins opgewipt.

2 BOVENDELEN: Mantel - grijsachtig, rug - donkerbruin met zwarte strepen, stuit - bruin, staart - had hooguit drie of vier staartpennen waarvan de buitenste staartpen veel wit, vleugels - donkerbruin met lichte vleugelstreep.

3 ONDERDELEN: borst en flanken - isabel kleurig, zwart gestreept, buik - vuilwit, ongestreept, poten - lichtbruin.

Konkluderend uit de veldnotities en nageslagen literatuur betrof deze waarneming een Dwerggors. Deze in Siberie en Noord Rusland tot in N.O.-Noorwegen broedende gors overwintert in Zuid tot Zuidwest Azie. In Nederland is de Dwerggors een zeldzame, onregelmatige gast, overwegend in trektijden.

Deze waarneming is door de C.D.N.A. aanvaard.

John Vereijken, Margrietstraat 59, Beek en Donk  
Piet van Tilburg, Antoniusstraat 33, 5725 AP Heusden (gem. Asten).

#### BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN GRUTTO'S TE SONNIUSWIJK, SON.

##### Inleiding

In 1987 heb ik een broedvogelinventarisatie van Grutto's uitgevoerd in het agrarische gebied Sonniuswijk, gelegen ten noordwesten van Son en Breugel. Ik heb dit gedaan omdat het gebied in de nabije toekomst verkaveld wordt in het kader van de ruilverkaveling Sint Oedenrode. De resultaten van deze inventarisatie worden in deze mededeling besproken en worden vergeleken met een inventarisatie uit 1982.

##### Het gebied

Het geïnventariseerde gebied ligt voor het grootste deel in de gemeente Son en Breugelen voor een klein deel in de gemeente Best (figuur 1).