

SOVON-NIEUWS



BSP-RESULTATEN BREDER BEKEKEN

Dit broedseizoen gaat het Bijzondere Soorten Projekt (BSP) van SOVON zijn vierde 'levensjaar' in. Zoals het alle landelijke projecten vergaat of is vergaan, zo vergaat het ook het BSP: Alle begin is moeilijk! Desalniettemin mogen we na drie inventarisatiejaren constateren dat we op de goede weg zitten. Voor eenieder die het nog niet weet, het volgende. Het BSP probeert antwoord te geven op vragen als: Welke zeldzame en schaarse vogelsoorten gaan in Nederland vooruit of achteruit? Hoe snel verloopt die toename of afname en bestaan daarin eventueel regionale verschillen?

Een groot deel van de zeldzame vogels, waartoe we gemakshalve ook de kolonievogels rekenen, worden reeds landelijk geteld. Er zijn echter nog hiaten. Over deze hiaten wil ik het in deze korte bijdrage hebben.

De BSP-Resultaten-tabel spreekt eigenlijk al voor zich, maar voor alle duidelijkheid zal ik enkele probleemgevallen toelichten.

Wat betreft de kolonievogels mogen we niet klagen. Nagenoeg alle kolonievogels worden districtsdekkend dan wel landdekkend geteld, uitzonderingen daargelaten. Onverwachte vestigingen van bijvoorbeeld Oeverzwaluw of Roek kunnen wel eens over het hoofd worden gezien. De zeldzame vogels staan er minder rooskleurig voor. Ik zal me beperken tot het bespreken van een drietal soorten, namelijk Roerdomp, Nachtzwaluw en Grauwe Gors.

Roerdomp: In de Atlas van de Nederlandse Vogels die onlangs is verschenen wordt de Nederlandse populatie geschat op 200 - 700 broedparen. De resultaten van het BSP voor 1985 en 1986 geven slechts aantallen van respectievelijk 41 en 45 broedparen. Een enorme ondertelling dus. Deze soort is volgens mij met recht een aandachtsoort voor 1988.

Nachtzwaluw: Wat de Nachtzwaluw betreft zou je je af kunnen vragen of vogelaars bang zijn in het donker!

De Nederlandse populatie wordt geschat op 500 - 800 broedparen, terwijl de BSP-resultaten over beide jaren ongeveer 100 broedparen weergeven. Oost-Brabant is, met zijn heidevelden en kaalkappen, erg belangrijk voor deze soort.

Zouden er niet meer dan 15 territoria zijn in Oost-Brabant?

Grauwe Gors: In 1986 is slechts één territorium van deze soort in Oost-Brabant vastgesteld (het betrof ook nog een losse melding!). Mijns inziens moeten er veel meer zitten. Landelijk gezien is het al beter. De Nederlandse populatie wordt geschat op 275 - 400 broedparen, terwijl het BSP over beide jaren ongeveer 80 broedparen aangeeft. Dit is slechts 15% van de totale Nederlandse populatie! Ook met recht een aandachtsoort voor 1988.

De tabel geeft nog meer aandachtsoorten weer zoals Porseleinhoen, Duinpieper en Grauwe Klauwier. De aantallen spreken, mijns inziens, voor zich. Wellicht dat de aantallen voor Oost-Brabant worden rechtgetrokken nu ook het Samenwerkingsverband actief gaat deelnemen aan het Bijzondere Soorten Projekt van SOVON.

3 SOVON BERICHTEN

Tabel. BSP-resultaten in vergelijking met de totale Nederlandse broedpopulatie.

Soort	Nederlandse populatie in		BSP-resultaten geheel Nederland		BSP-resultaten distrikt 16	
	1973-1977	1978-1983	1985	1986	1986	%
Bl. Reiger	9.500			8/9.000	191-200	2
Kokmeeuw	250.000	225.000- 275.000			14.000	5
Stormmeeuw	7.000				6	
Zilvermeeuw	53.000				4	
Visdief	8/10.000				6	
Zwarte Stern	2/3.000				14-16	
Oeverzwaluw				4/5.000	70-80	2
Roek		20.000	30.000		1464	5
Geoorde Fuut	30-70	30-225	63	87+B	33	36
Roerdomp	500-700	200-700	41	45	6	13
Woudaapje	100-135	35-75	3	2		
Grauwe Gans	100-135	200-300	103	40+B+D	6	10
Krooneend	40-60	30-65	0	0		
Bruine Kiek.	725-850	700-900	201+FL	170+FL	5	
Korhoen				83	35	42
Pors. hoen	50-200	150-1100	164	68+B	3	
Kwart. koning	100	150-600	38	13+D+C		
Bontbek Plev.	450-600	500-750				
Nachtzwaluw	500-600	500-800	81	136+2xB	15	10
IJsvogel	275-325	20-300	15	15	5	33
Draaihals	125-250	100-175	13	23		
Duinpieper	75-90	50-75	6	12	2	17
Gr. Gele Kwik	120-175	100-275	38+B	28		
Paapje	1000-1100	700-1000	131	164		
Kramsvogel	54-75	700-900	33	174	1	0,6
Gr. Karekiet	1200-1600	350-750	100+D+3xC	97+3xB	1	
Gr. Klauwier	150	80-140	30	27	2	
Klapekster	10-15	12-18	3	2		
Grauwe Gors	400-800	275-400	73	37	1	2


Verklaring: weergegeven zijn de (geschatte) Nederlandse populatie in 1973-77 en 1978-83 en de resultaten van het BSP-onderzoek. In de meest rechtse kolom staan de BSP-resultaten van district 16 (Oost-Brabant). Het percentage geeft aan welke fraktie van het aantal paren, dat het BSP in heel Nederland heeft opgeleverd, voor rekening van Oost-Brabant komt (1986).

_____ = aandachts-soort in 1988


FL = Flevopolders

B,C,D = aantalsklassen (B: 2-5, C: 6-10, D: 11-25 paren)

Enkele resultaten van het BSP in Oost-Brabant, 1986




GEORDE FUUT




ROERDOND

5 SOVON BERICHTEN

Enkele resultaten van het BSP in Oost-Brabant, 1986 (vervolg)




GRAUWE GANS




PORSELEINHOEN

Enkele resultaten van het BSP in Oost-Brabant, 1986 (vervolg)




Duinpieper




Duinpieper at

7 SOVON BERICHTEN

Enkele resultaten van het BSP in Oost-Brabant, 1986 (vervolg)




ZWARTE STERN




KOKMEEUW

Enkele resultaten van het BSP in Oost-Brabant, 1986 (vervolg)



ZILVERMEEUW



ROEK

9 SOVON BERICHTEN

Ernest van Asseldonk, Schout Kellenerstraat 68, 6042 XH Roermond.

Literatuur

SOVON (1987). Atlas van de Nederlandse Vogels. SOVON, Arnhem.

Teixeira. R. M. (1979): Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Natuurmonumenten, 's-Graveland.

