

EERSTE RINGVANGST VAN EEN DWERGGORS IN DE KEMPEN.

Op 14 september 2002 was ik aan het ringen in het bosgebied de Molenheide te Hulsel. Het was niet zo'n beste vangdag en ik wilde al gaan opruimen toen ik rond 11 uur bij de controle van de netten een bijzondere vogel had gevangen. Van een afstandje dacht ik dat het om een Heggemus ging, mede omdat ik daarvan lokgeluid had afgespeeld.

Dichterbij gekomen zag ik al dat het een gors was, in eerste instantie dacht ik even aan een Rietgors. Maar het vanggebied is helemaal geen rietgorzenbiotop. Het bestaat uit een aanplant van Zomereik van ongeveer 5 meter hoog gemengd met wat Berk, Vuilboom, Amerikaanse Eik en Amerikaanse Vogelkers. De ondergroei stelt niet veel voor: wat Bochtige Smele en Schapegras.

Bij het uit het net halen viel het lichte oogringetje en het bijzondere koppatroon op en ik begon al voorzichtig aan een Dwerggors te denken, ik kende de soort nog van het ringen op Schiermonnikoog. Na de literatuur te hebben geraadpleegd was ik al snel overtuigd dat het inderdaad een Dwerggors was. Daarom Pieter Wouters maar even gebeld om wat dia's te maken. Hij was er redelijk vlot en kon behalve enkele dia's ook nog wat video-opnamen van de vogel maken.

De volgende kenmerken heb ik waargenomen en leidden tot de determinatie. Koppatroon: kruinveren met een gedeeltelijk kastanjebruine vlag deels verborgen door lichtere veerranden. Geen wit in de nekveren. Rond de ogen een ring van licht geelbruine veertjes, die duidelijk afsteken tegen de wangen en wenkbrauw. De oorstreek, wang en de teugel, het gebied tussen oog en snavel, vrij egaal warmbruin, naar boven wat lichter wordend en aan de onderrand afgezet door een lichte snorstreek. Door het egaal gekleurde gebied rond het oog krijgt de vogel een beetje een onnozele gezichtsuitdrukking zoals een Goudhaantje ook heeft.

De rug van de donker gekleurde bovensnavel is een beetje hol waardoor er een licht opgewipte indruk ontstaat. De veren op de vleugelboeg zijn grijsbruin, zeker niet kastanjebruin zoals bij een Rietgors. De vleugellengte was 71 mm. Op grond van de schedelverbening kon worden vastgesteld dat het een jonge vogel betrof.

Na het ringen, meten, fotograferen en video-en werd de vogel weer vrijgelaten. Daarbij liet hij een enkel roepje horen: een scherp 'tik' als van een Roodborst, maar naar mijn indruk nog iets korter. De gors ging op enkele meters in een boompje zitten en kon nog even bekeken en gevideod worden. Daarna verdween hij uit het zicht.

Volgens de website Vogels in de Kempen is dit de tweede waarneming in de Kempen. Op deze site: (<http://www.homepages.hetnet.nl/~vogelskempen/>) zijn twee foto's van de vogel te bewonderen, kijk onder multimedia.

Jan Wouters



Foto: Pieter Wouters