

RINGVANGST VAN EEN ORPHEUSSPOTVOGEL IN DE KEMPEN

Op 23 juli 1998 ving ik aan de Braken in Reusel in een mistnet een vogel die ik in eerste instantie voor een Spotvogel aanzag. In de hand voelde hij wel wat klein aan voor die soort. Tijdens het meten van de vleugel werd mijn gevoel bevestigd: de vleugel was 10 mm korter dan gewoonlijk bij een Spotvogel. Toen nog maar eens goed gedetermineerd. Daarbij kwam ik uit op de Orpheusspotvogel.

Behalve door de kortere vleugellengte wordt deze soort gekenmerkt door een andere vleugelformule: niet de derde, maar de vierde handpen is het langste. Daardoor is de vleugel iets minder spits dan bij de Spotvogel. Verder is de pootkleur iets minder blauwgrijs, meer bruingrijs.

Op grond van het gesleten verenkleed was te zien, dat het een overjarige vogel was. De cloacavorm wees op een mannetje, er was ook geen spoor van een broedvlek te bekennen.

De Orpheusspotvogel, met zijn verspreidingsgebied in het zuidwesten van Europa, breidt zich naar het noordoosten uit. Hij broedt ook al in België en in 1998 werden ook enkele territoria in Nederland vastgesteld. In 1996 werden er twee geringd in ons land, in 1997 geen. De Reuselse Orpheusspotvogel werd na het ringen nog gefotografeerd en op video vastgelegd voor hij werd vrijgelaten.

In de waarnemingsrubriek in de Blauwe Klauwier is de Orpheusspotvogel al één keer eerder gemeld uit de Kempen. Op 14 juni 1996 werd een exemplaar waargenomen bij de Plateaux. Het lijkt er dus op dat we er weer een nieuwe broedvogelsoort bij gaan krijgen. Voor de atlasinventariseerders zaak om alert te zijn op deze zanger.

Jan Wouters

