

## VOGELS EN VLIEGERS 2

Er zijn tegenwoordig vliegers te koop in allerlei vogelsilhouetten. Ik sprak iemand die een vlieger in de vorm van een Buizerd had, ongeveer op ware grootte. Toen deze vlieger op ongeveer 200 meter hoogte stond, kwamen er twee Buizerden omheen schroeven.

HANS SCHRADER

## WAARNEMING VAN EEN HOP

Op de avond van 2 mei 1996 was ik op het landgoed Ten Vorsel in Bladel. In het beekdal van de Grote Beerze zaten veel Wilde Eenden, een Wulp en een koppeltje Patrijzen. Toen ik weer richting huis wilde gaan, vloog er plotseling een Hop op uit de berm. Hij vloog in een fruitboom in het boomgaardje bij een boerderij. Ik heb hem daarna ondanks veel speuren met de kijker niet meer gezien.

Het lijkt erop dat de Hop de laatste tijd weer meer wordt gezien. Zo heeft er in 1995 in Casteren blijkbaar een gebroed. Volgens het boek 'Dieren van onze landschappen' van K. Hana uit 1943 kwam de Hop toen nog geregeld voor in het zuidoosten van ons land.

TONNY VAN DER VLEUTEN

*Naschrift redactie:* Ook in 1996 zou de Hop weer in Casteren gezeten hebben, zo willen de geruchten. (Zie ook SOVON Nieuws van september '96.) Maar er zijn mij verder geen waarnemingen bekend. Overigens ligt Ten Vorsel precies ten zuiden van Casteren! De waargenomen vogel kan goed daar naar op weg geweest zijn.

In de Belgische regio tussen Turnhout en Postel heeft dit jaar eveneens een Hop gebroed volgens Marc Smets. Misschien door jongen van 1995 uit Casteren?

## WAARNEMING VAN EEN ZINGENDE ROODMUS OP DE LANDSCHOTSE HEIDE

Op 31 mei 1996 was ik op de Landschotse Heide om vogels te ringen in het kader van het Constant Effort Site projekt. Tijdens het controleren van de netten werd mijn aandacht getrokken door de vreemde zang van een vogel, die ik ergens van herkende, maar niet uit de Kempen. Ja, dat moet een Roodmus zijn. Die had ik op Schiermonnikoog gezien en gehoord.

De vogel zat op 10 meter van het net te zingen, maar ik kon hem eerst niet zien. Toen ik zijn zang imiteerde kwam hij nog iets dichterbij, maar hij zat nog steeds achter een wilgestruik. Ik dacht al, als ik hem niet te zien krijg, ben ik er toch al vrijwel zeker van dat het een Roodmus is. Dan kan ik thuis zijn zang even opzoeken om dat de bevestiging.

Gelukkig hij bleef zingen en kon ik zo gaan staan dat hij in beeld kwam. Met de verrekijker kon ik zien dat het inderdaad een Roodmus was. Een vogel ter grootte van een Groenling met een musachtig uiterlijk, niet rood, maar grijsbruin met een gevlekte borst. Zijn stuit heb ik niet gezien. Als hij dan ook nog zingt, is het een jong mannetje.

Na vijf minuten was hij weg. Ik heb hem later niet meer gezien of gehoord. Waarschijnlijk is het een rondzwervend exemplaar geweest. Dus (nog) geen geldig territorium of broedgeval. De datumgrenzen voor de Roodmus zijn bij het BMP 10 en 30 juni. Aangezien de soort zich in Nederland uitbreidt, valt te verwachten dat hij zich ook in de Kempen vaker zal vertonen. Er zijn twee eerdere waarnemingen in de Kempen: een zingend mannetje bij Hanevoet enkele jaren geleden en een mannetje foeragerend op 14 augustus 1994 bij Hulsel.

JAN WOUTERS