

BRAAKBALLEN UIT HET ECKARTSE BOS

Op 17 januari 1993 leidde Yves een excursie naar het Eckartse Bos en de waterzuivering in Eindhoven. Aanwezig waren van JNM afdeling Veldhoven: Frank, Niels, Martijn en ik, en van VWG de Kempen: Kees, Huub en Bennie. Bij de waterzuivering zagen we 1 IJsvogel, 1 Grote Gele Kwik en 2 Tjiftjafs. In het Eckartse Bos ontdekten we 1 Valkparkiet en 1 Halsbandparkiet, alsmede enkele Ransuilen op de bekende roestplaats. Hier verzamelde ik enkele braakballen ('Eckartse Bos 2'). Een eindje verderop, in de buurt van de hondenbaan, vond ik nog een tiental braakballen ('Eckartse Bos 1'). Op deze plek waren op dat moment geen Ransuilen aanwezig. Thuis heb ik de braakballen uitgeplozen. De inhoud ervan was qua soortensamenstelling vrij verrassend, zie tabel.

soort	Eckartse Bos 1		Eckartse Bos 2	
	aantal	%	aantal	%
Veldmuis	1	2,6	5	9,4
Aardmuis	15	39,5	27	50,9
Veld- of Aardmuis	2	5,3		
Ondergrondse Woelmuis	1	2,6		
Veldmuis of Onder. Woelmuis			1	1,9
Rosse Woelmuis	5	13,2		
Bosmuis	6	15,8	5	9,4
Dwergmuis	4	10,5	7	13,2
Huisspitsmuis			1	1,9
zangvogel spec.			1	1,9
'Vink'			2	3,8
'Ringmus'	3	7,9	1	1,9
mees spec.			2	3,8
'Pimpelmees'	1	2,6		
'Staartmees'			1	1,9
totaal	38	100%	53	100%

Uit deze resultaten kunnen geen harde conclusies worden getrokken. Dit komt doordat de braakballen niet systematisch werden verzameld. Het aantal Ransuilen dat ze heeft geproduceerd is niet bekend, en evenmin de tijd waarin dit gebeurde. Wel kunnen we ervan uitgaan dat alle braakballen in de winter zijn geproduceerd, omdat

ze redelijk vers waren toen ze op 17 januari werden verzameld. Er kunnen uit braakballenonderzoek trouwens zowiso nauwelijks harde conclusies worden getrokken. Er zijn desalniettemin enkele opvallende punten:

- het grote aandeel van de Aardmuis in het menu van de Ransuilen uit het Eckartse Bos, zowel absoluut als relatief ten opzichte van de Veldmuis, die normaal gesproken toch ook behoorlijk veel wordt gegeten door Ransuilen.
- 5 Rosse Woelmuizen op een totaal van 38 prooidieren is ook vrij veel. Rosse woelmuizen worden door Ransuilen nauwelijks gegeten.
- een vrij hoog percentage Dwergmuizen. Deze dieren leven echter in de winter op de grond in plaats van in de begroeiing. Hierdoor zijn ze voor uilen gemakkelijker te vangen.
- 1 Ondergrondse Woelmuis in een partij van slechts 10 braakballen is een leuke toevalstreffer. Deze muizesoort is in Brabant niet ongewoon, maar wordt slechts weinig door uilen gevangen omdat hij voornamelijk ondergronds leeft.
- de schedelresten van vogels konden niet tot op de soort worden gedetermineerd. De meest waarschijnlijke soort is tussen aanhalingstekens vermeld.

Er werden ook nog 3 braakballen van een Steenuil verzameld. Deze werden gevonden in een holle knotwilg in het agrarische gebied tussen het Eckartse Bos en de Kleine Dommel. De inhoud bestond uit de resten van 2 mestkevers, 4 Dwergmuizen en 1 Huis- of Bosmuis.

Bram Aarts

