

B

WAARNEMING KUIFAALSCHOLVER BIJ DE FLAES

Op 17 oktober 1987 was ik samen met een lid van de Belgische Jeugdbond bij de Flaes aan het vogelen. Opeens werd onze aandacht getrokken door 2 redelijk forse vogels die vanaf het oosten kwamen aanvliegen. Al snel bleken het aalscholvers te zijn maar de ene bleek een stuk kleiner dan de andere (spannend hè). Dit werd eerst afgedaan als het gebruikelijke (?) verschil tussen het mannetje en het vrouwtje of juveniel en adult. Maar al snel zagen we dat bij het kleinere beest de vleugelslag

sneller was en het silhouet anders. Vooral de hals week af: hij was een stuk korter en slanker gebouwd. Toen de vogel dichterbij kwam viel ook het dunne snaveltje op.

Het betrof hier een juveniele vogel gezien de hoeveelheid lichtbruin op de bovenborst, die bij een gewone aalscholver veel groter is.

Dit is voor zover ik en de avifauna weten de eerste waarneming van deze soort in de Kempen.

Pierre van de Wielen.

OP VLINDER JAGENDE SPERWER

Op 29 september 1987 was ik al lopend mijn nieuwe woonplaats (Arnhem) aan het verkennen toen ik in een van de buitenwijken een mannetje sperwer ontdekte.

Ik merkte de vogel op door de vreemde capriolen die de vogel uithaalde. Nieuwsgierig liep ik naar de sperwer toe die nog steeds fanatiek aan het stuntsen was. Dichtbij gekomen bleek een atalanta het doelwit te zijn. Ondanks de acties van de sperwer bleef de

vlinder rustig doorvliegen en werd na een paar minuten weer met rust gelaten.

Is zo'n sperwer met boomvalk-allures al eens eerder gezien of is er iets dergelijks uit de literatuur bekend?

Pierre van de Wielen.

N.B. Het Handbook van Cramp & Simmons vermeld vlinders niet als prooi, wel kevers en libellen. (Jan Wouters)

