

NESTKASTEN KONINGSHOF 1986.

Bij de voorjaarsschoonmaak op 8 maart 1986 kwamen we al de eerste jongen van het broedseizoen tegen: van de Bosuil. De andere soorten waren toen nog lang niet toe aan broeden. Vanwege het koude voorjaar was de eerste controle ongeveer een week later dan andere jaren en dat bleek niets te laat te zijn. De controles werden gehouden op de avonden van 14 mei, 2 juni en 23 juni. Op de laatste datum zijn we halverwege weggeregend zodat de tweede helft van de laatste controle pas op 30 juni is gehouden. Bij de controles en het schoonmaken zijn Wim van de Voort, Albert met Joris en Joep, Rob met Frank, Guus en Pieter een of meerdere keren behulpzaam geweest. Verder liep ik op een van de avonden ook nog Neelie Smit-Kroes bijna tegen het lijf, maar ze bleek ergens anders voor te zijn gekomen.

De resultaten van de controles op 14 mei en 2 juni zijn in tabel 1 terug te vinden als eerste broedsels, de broedsels die daarna nog zijn aangetroffen als tweede broedsels.

TABEL 1: Totale resultaten van de nestkastencontroles op Koningshof te Veldhoven in 1986.

SOORT	1e BROEDSEL	2e BROEDSEL	TOTAAL
Koolmees	36	10	46
Pimpelmees	14	-	14
Kuifmees	2	-	2
Zwarte Mees	1	-	1
Bonte Vliegenvanger	3	-	3
Gekraagde Roodstaart	1	-	1
Holenduif	1	2	3
Bosuil	1	-	1
Totaal aantal broedsels			71
Nest van Eekhoorn			3
Nest van Wesp			2
Niet gebruikte kasten			36
			<hr/>
Twee keer gebruikte kasten			- 11
Totaal aantal kasten			101

Het totale aantal broedsels was met 71 het laagste sinds 1976. Dat lijkt vrijwel geheel te wijten aan de terugval van

het aantal Koolmees-broedsels: met 46 is het niveau weer hetzelfde als in 1981. Als we kijken naar het aantal eerste broedsels, wat een maat moet zijn voor de omvang van de broedpopulatie, dan zitten we weer op het niveau van 1979. Het lijkt erop dat de Koolmees meer heeft geleden van de winter van 1986 dan van die van 1985. De teruggang in '85 was 5 paar ofwel 10% en in '86 daalde het aantal paren met 9 ofwel 20%.

De Pimpelmees daarentegen lijkt niets geleden te hebben en is met een toename van 3 paren weer op het niveau van 1984. De Bosuil had kennelijk ook minder moeite met de winter dan het jaar ervoor, getuige de 4 jongen op 8 maart. Dat betekent dat hij (zij) in januari de eieren gelegd moet hebben. Dat was in 1986 een wat zachtere periode. In 1985 was januari juist erg koud en toen was de Bosuil nog niet eens met de leg begonnen. Zo zien we duidelijk hoe het weer, de timing van het broedseizoen beïnvloedt.

Ook tijdens de eerste controle bleek dat nog eens, want ondanks dat we een week later waren dan in andere jaren, troffen we nog geen nesten aan met jongen. In normale jaren heeft toch gauw zo'n 25% al jongen begin mei.

Dat het broedseizoen toch niet voor alle vogels slecht was blijkt uit het broedsel van de Zwarte Mees, die vlakbij een door rupsen kaalgevreten Vogelkers woonde. Voedsel genoeg dus, hij had dan ook 12 vliegvlugge jongen. Dat is het maximale aantal wat in Elseviers Broedvogelgids wordt genoemd voor de Zwarte Mees.

Verheugend is ook de terugkeer van de Gekraagde Roodstaart, voor het eerst weer aanwezig sinds 1982. We moeten afwachten of hij stand kan houden.

Ook in 1987 worden er weer drie avondcontroles gepland, de juiste data zullen tijdig bekend worden gemaakt. Iedereen is welkom.

Jan Wouters
nestkastcoördinator