

## VOGELVARIA

LEX PEETERS

## FENOLOGIE


Ik heb in de jaren 1983 t/m 1986 van een aantal soorten vogels de vroegste aankomstdatum genoteerd in mijn vogellogboek.

Deze datums heb ik in een tabel gezet, om na te gaan of er verschillen zijn als er een laat voorjaar is, of als er een strenge winter is geweest.

De gegevens zijn niet uitgebreid genoeg om er enige conclusies aan te verbinden, maar ik wil ze u niet onthouden.

soort	1983	1984	1985	1986
veldleeuwerik	2-3	11-2	2-2	8-3
zwarte roodstaart	24-3	27-3	31-3	18-3
tjiftjaf	15-3	27-3	25-3	18-3
roodborsttapuit	25-3	29-3	2-3	21-3
grutto	----	21-3	9-3	22-3
geoorde fuut	17-4	13-5	6-4	5-4
blauwborst	----	14-4	4-4	5-4
tapuit	20-4	17-5	6-4	5-4
fitis	4-4	6-4	3-4	5-4
boerenwaluw	2-4	31-3	6-4	5-4
gele kwikstaart	28-4	8-5	17-4	18-4
regenwulp	----	18-4	17-4	22-4
zwartkop	15-4	14-4	6-4	23-4
boomkruiper	9-4	----	----	23-4
koekoek	19-4	14-4	17-4	23-4
braamsluiper	20-4	3-5	9-5	25-4
tureluur	9-4	31-3	17-4	22-4
zwarte stern	17-4	14-4	25-5	1-5
nachtegaal	23-4	3-5	29-4	12-5
tuinfluiter	23-4	2-5	3-5	30-4
tortelduif	23-4	17-5	4-5	27-4
gekraagde roodstaart	23-4	5-5	15-4	26-4
gierzwaluw	23-4	----	28-4	1-5
grasmus	24-4	4-5	29-4	28-4

Henk Munsters



Tapuit