

VOGELVARIA

door» lex peeters

Voorwoord:

Zoals bij het doornemen van deze Vogelvaria zal blijken, bevat deze editie veel besprekingen van waarnemingen. Het is de bedoeling dat dat in de toekomst meer gaat gebeuren, en niet alleen door mij! Doe je een waarneming van een minder algemene of een moeilijk determineerbare soort, neem dan met mij contact op. We kunnen dan overleggen hoe je aanvullende, vergelijkbare gegevens kunt bekomen, en hoe je je artikeltje opzet.

Ook zal in deze Vogelvaria blijken dat veel waarnemingen afkomstig zijn van de Hees te Eersel. Dat komt omdat deze plas afgelopen najaar zeer regelmatig - bijna dagelijks - bezocht is door Hein Prinsen en kornuiten. Hein hoopt in de loop van 1986 zoveel gegevens van dit gebied verzamelt te hebben (ook van vóór 1985) dat hij voor de Blauwe Klauwier een interessant artikel kan schrijven. STEUN 'm daarbij. Alles sturen naar:

H. Prinsen, Postakkers 29 5521 AR Eersel 04970 - 16038

In de Volgende Blauwe Klauwier zal weer een fenologie-overzicht en het jaarlijkse waarnemingen-overzicht gepubliceerd worden. In beide gevallen is 't nodig dat IEDEREEN zijn gegevens hiervoor inzendt. Dit om het beeld volledig te maken.

- fenologie-gegevens naar: Pierre Boudewijn, Bloxstraat 28, 5521 km EERSEL.
- Leuke waarnemingen naar: Henk Hendriks, Groesstraat 5, 5662 ET GELDROP.

Lex Peeters.

TWEE NIEUWE WAARNEMINGEN VAN TEMMINCK'S STRANDLOPER

Gedurende augustus 1985 werd 2 x een Temminck's strandloper in de Kempen gezien. Het zijn respectievelijk de achtste en de negende waarneming van deze soort in ons werkgebied.

- Op 08-08-'85 bevond zich 1 ex, in de korte begroeiing van het Wit-hollandven, op de Landschotse heide (L.Peeters).
- Op 28-08-'85 werd 1 adulte ex. door Wiel Poelmans op de Loozerheide waargenomen.

Eerdere waarnemingen zijn:

30-08 t/m. 06-09-'58	max. 2 ex.	Mierlo (Limosa 33/32)
20-04-'60	1 ex.	Goor & Flaes (Limosa 35/61)
18-07-'60	1 ex.	Goor & Flaes (A.Wittgen)
06-07-'64	1 ex.	Landschotse heide (A.Wittgen)
11-05-'72	1 ex.	Landschotse heide (J.van Kessel)
26-04-'81	1 ex.	Loozerheide (H.Hendriks)
14-09-'81	5 ex.	Keyenhurk, Landschotse heide (H. Sierdsema)

De mogelijkheid is groot dat de soort veel vaker in de Kempen doortrekt, dan op grond van bovenstaande waarnemingen verwacht zou worden. De Temminck's-strandloper houdt zich immers i.t.t. andere strandlopers veel in vegetatie op. Bovendien is de soort vrij makkelijk te verwisselen met de Kleine Strandloper. Oplettendheid is dus geboden!

Voor overeenkomsten en verschillen tussen beide soorten, zie:

- Hendriks H. Vogelwaarnemingen in de Kempen. Blauwe Klauwier 6.4.-

Literatuur:

- Erve van c.s. ('67) Avifauna van Noord-Brabant.
- Hendriks H ('81) Vogelwaarnemingen in de Kempen. Blauwe Klauwier 7.5.-