

TOENAME SCHOLEKSTER OP EKKERSWEIJER

ERNEST VAN ASSELDONK


Inleiding

Al enkele jaren wordt door mij in het voorjaar zoveel mogelijk het aantal Scholeksters geteld op Ekkersweijer; een recreatiegebied in wording ten noorden van Eindhoven. Ekkersweijer is één van de gebieden in ons werkgebied waar Scholeksters zich in het voorjaar verzamelen. De belangrijkste andere gebieden zijn: Budel-Dorplein, Landschotse Heide en het Soerendonks-Goor (Peeters 1983). Het is nog niet duidelijk om wat voor een vogels het hier gaat: broedvogels, doortrekkers of beide. Een verder onderzoek hierna zou wellicht interessant kunnen zijn, mede omdat er over het aantalsverloop van de Scholekster in het binnenland weinig bekend is.

Resultaten

Grafiek 1 geeft de toename van de Scholekster weer vanaf 1980, samengesteld uit de voorjaarsmaxima.

Grafiek 1. Voorjaarsmaxima van het
aantal Scholeksters op
Ekkersweijer



De hoogste aantallen Scholeksters zien we in het voorjaar, meestal eind maart/begin april. Uitzonderingen bevestigen echter de regel (mond. meded. Lex Peeters). De aantallen op Ekkerswei lijken sprongsgewijs te stijgen, dit is echter te wijten aan verschillen in de telfrequentie per seizoen.

Discussie

In 1983 werd al door Lex Peeters vermeld dat de Scholeksters zich in het voorjaar steeds meer voorverzamen in reeds genoemde gebieden. Dit was ook op Ekkerswei het geval. De omstandigheden die de Scholeksters in het voorjaar op Ekkerswei aantreffen zijn vrij ideaal. Het gebied biedt namelijk zowel dag- als nachtaccommodatie. Overdag fourageren de Scholeksters op drassige kleigronden langs de visplas, 's nachts slapen ze op drijvers van de zandzuiger op de in aanleg zijnde recreatieplas. Of de aantallen mogelijk nog groter kunnen worden blijft afwachten, maar zeker de moeite waard om bij te houden.

Tenslotte zou ik iedereen willen vragen alle gegevens m.b.t. Scholeksters in de Kempen (zowel broed- als niet broedvogels) aan mij door te geven. Hierbij neem ik het initiatief van Lex Peeters (1983) over, die mij na het lezen van de concepttekst aanspoorde meer gegevens te verzamelen over de Scholekster in de Kempen. Lex, nog bedankt voor je medewerking én de eerste gegevens.

Literatuur

Peeters, L. (1983): De Scholekster behoort in steeds meer opzichten tot de typische Kempische vogelbevolking v/h agrarische land.
Blauwe Klauwier 9 (3) : 8.