

WAARNEMING WATERRIETZANGER IN DE KEMPEN.

Op 09-09-'85 wandelde Frank Neyts langs het Soerendonks Goor. Op een gegeven moment vloog vlak bij hem een geel-achtig gekleurd zangvogeltje van de oever weg, om een eindje verder in het Liesgras weer in te vallen. Na even zoeken ontdekte Frank de vogel op c.a. 3 meter afstand op een halm. Het bleek - ondermeer gezien de brede lengtestreep op de bovenkop - een Waterrietzanger te zijn. De vogel liet zich gedurende 2 minuten in allerlei standjes bekijken, was niet schuw en reageerde nieuwsgierig op geluidjes als het knippen met de vingers. Dit soort nieuwsgierigheid schijnt kenmerkend te zijn voor Waterrietzangers! Het betrof hier een onvolwassen exemplaar, gezien de gelige kleur en de zeer fijne streeptekening op de borst. Dit laatste is weliswaar in tegenspraak met Neyts ('84), maar later speurwerk in de literatuur levende op dat de mate van streping op de borst als leeftijdskenmerk gebruikt kan worden.

De Kempen kent erg weinig waarnemingen van Waterrietzangers. Toch trekt de soort waarschijnlijk regelmatig door dan op grond van het kleine aantal waarnemingen verwacht zou worden. Zo ringde van Aerle in '67, '68, '69, '70, '71 en '72 bij het Beuven respectievelijk -/1/1/1/3 en 1 ex. De soort valt niet erg op en is bovendien slechts bij "insiders" bekend! Door middel van het opstellen van mistnetten - bijvoorbeeld in een rietkraag, zoals van Aerle dat t.b.v. het ringwerk bij het Beuven doet - kan nog onbekende doortrek van dit soort onopvallende vogels toch worden aangetoond!

Voor determinatieverschillen tussen Rietzangers en Waterrietzangers zie:

- Neyts F. ('84) "Probleemgeval: Rietzanger - Waterrietzanger"
De roodborsttapuit, jaargang 2, nr.3, blz. 39-40.

