

WAARNEMING ENGELSE GELE KWIKSTAART IN DE KEMPEN.

Op 03-04-'85 zag Olaf Schouwenaars om 14.30 uur een "gele" Kwikstaart op een braakliggende akker achter de klotputten ten zuidwesten van Eindhoven. De vogel bevond zich in eerste instantie tussen c.a. 25 Witte Kwikstaarten, maar vloog na verloop van tijd op, om op c.a. 15 meter afstand van de waarnemer weer in te vallen.

De kwikstaart was niet schuw en kon met de "Peterson" in de hand goed bekeken en vergeleken worden. De vogel was zichtbaar kleiner dan de Witte Kwikstaarten; buiten een gele oogstreep was de kop geel-groen, welke kleur tot op de rug doorliep.

Deze kenmerken lieten er geen twijfel over bestaan hier met een Engelse Gele Kwikstaart te maken te hebben.

Het was deze dag helder weer, er was veel zon en de temperatuur liep op tot 20 graden C.

De Kempen kent slechts zeer weinig waarnemingen van deze ondersoort. Bovendien is de datum vrij vroeg. Engelse Gele Kwikstaarten kunnen weliswaar vanaf eind maart in Nederland worden waargenomen, maar vergelijk de reeks van voorjaars-waarnemingen, die de Avifauna van Noord-Brabant '67 (van Erve c.s.) geeft:

- 29-03-'59: 4 ex. Tilburg (Vogeljaar 7,208)
- 24-04-'63: 1 ex. Eindhoven (Limosa 38,56)
- 27-04-'63: 1 ex. Udenhout (Limosa 38,56)
- 28-04-'65: 1 ex. Tilburg (Kuiper)
- 23-05-'64: 1 ex. Esch (Limosa 39,71)
- 04-06-'60: 1 ex. Biesbosch (Limosa 36,35)

WAARNEMINGEN VAN ZWERVENDE KORHAAN.

In het voorjaar van 1982 kwam een einde aan de Korhoender-populatie van de Reuselse Moeren.

Op 15-04-'85 zag Wim van de Voort bij Ter Moeren, een voormalige baltsplaats hier, een Korhaan! De vogel vloog opgeschrikt het reservaat in. Ondanks de oplettendheid van enkele mensen werd de haan nadien gedurende 10 dagen niet meer gezien. Hierbij dient vermeld te worden dat de kern van het gebied niet werd bezocht.

Op 25-04-'85 zag Pierre v.d. Wielen de vogel terug, wederom bij Ter Moeren.

Op 15-04-'85, dus op de dag van de eerste waarneming bij de Reuselse Moeren, zagen jagers een Korhaan bij het Beleven te Reusel. Op 17-04 werd deze vogel hier door Pierre v.d. Wielen bolderend gehoord!

Het Beleven kent enkele incidentele waarnemingen van Korhoenders uit de tijd dat deze soort nog op de nabij gelegen Moerbleek broedde !

De afstand tussen de Reuselse Moeren en het Beleven bedraagt in vogelvlucht $6\frac{1}{2}$ kilometer. De mogelijkheid is dus groot dat de waarnemingen betrekking hebben gehad op een en dezelfde vogel, die in de omgeving van Reusel rondzwierf of tussen beide gebieden pendelde.

Met betrekking tot migratie-bewegingen van het vrij plaatsgebonden Korhoen, bestaan er weinig gegevens!