

Bl.-kl. 11(2), 1985

AFWIJKEND GEKLEURDE KNEU.

Op 06-05-'85 hoor ik aan een kaalkap tussen Goor & Flaes het zingen van een Kneu. Omdat het geknutter mij een beetje monotoon overkomt, besluit ik de vogel op te zoeken. Met weinig moeite ontdek ik de mannelijke Kneu samen met 2 vrouwtjes in de kruin van een vrij kale Eik. Meteen vallen me twee merkwaardige kleurafwijkingen op! De vogel heeft spierwitte wang- en de borst plus volledige buik, dus de totale onderzijde, zijn rood-rossig van kleur. Hierdoor komt de vogel heel anders over dan een mannetje Kneu. Alle andere kenmerken waren echter normaal aanwezig! Mogelijk betrof het een ontsnapte, gekweekte mengvorm.

Lex.

WAARNEMING HOP IN BEERSE BROEK.

80ms

Vorig jaar werd in een kort artikel onder deze rubriek, kenbaar gemaakt dat we de Hop de laatste jaren weer kunnen aanmerken als een "zeldzame, doch jaarlijkse doortrekker" in de Kempen!

Ook in het voorjaar van 1985 is weer een waarneming bekend geworden:

- Op 15-05 hoorde Pierre v.d. Wielen in de Beerse Broek een geluid dat hem onbekend in de oren klonk. Na een tijdje zoeken vloog een Hop van 'm vandaan!

GROTE CONCENTRATIE GRUTTO'S OP DE LANDSCHOTSE HEIDE.

80ms

B

De meeste jaren arriveren de eerste Grutto's in de Kempen tijdens de tweede helft van februari. De strenge winter, die tot medio-februari het weerbeeld in vrijwel geheel Europa bepaalde, was er waarschijnlijk de oorzaak voor, dat de terugtrek in 1985 pas begin maart op gang kwam. Maar toen ging het ook meteen erg snel.

Op 08-03 telden enkele mensen bij het Kromven (Landschotse heide) reeds c.a. 450 ex. en een dag later, op 09-03-'85, kwamen bij het zelfde ven tenminste 900 ex. overnachten.

Een concentratie van deze orde van grootte is zelfs voor dit deel van de Kempen, waar in het voorjaar en vroege najaar wel eens vaker enkele honderden Grutto's bijeen gezien worden, een uitzondering!

Ter vergelijking:

Uit het voorjaar zijn dit de twee grootste groepen:

- 03-03-'78: 400 ex. omgeving Neterselse Heide
- 15-03-'79: 200 ex. idem.

En vervolgens hieronder een overzicht van de concentraties in het vroege najaar (juli), die over het algemeen veel omvangrijker zijn:

- 18-06-'66: 500 ex. Omgeving Neterselse heide
- 23-06-'66: 1500 ex. idem (verdeeld over 3 groepen)
- 11-06-'77: 650 ex. idem
- 12-06-'77: 557 ex. idem
- 25-06-'78: 455 ex. idem

Lex.