

VOGELVARIA

LEX PEETERS

WINTERWAARNEMING VAN EEN KWAK.

Op 30-12-'84 was ik onderweg voor de "Stadvogelinventarisatie in "mijn" wijk. Ik was ongeveer aan de rand van de bebouwing, c.a. 200 meter van de visvijver van de wijk Hanevoet. In een Berkenboom tegen de gevel van een huis - op een hoogte van c.a. 4 meter - zat een Kwak op één poot een beetje slaperig voor zich uit te kijken. Het was naar mijn mening een onvolwassen, derde jaars exemplaar, zonder hoofdpluimen en met nog fletse kleuren. Van de vogel werden redelijk goede dia's gemaakt.

Later op de middag, toen ik op de plaats van waarneming opnieuw langs kwam, was de Kwak verdwenen.

Het betreft een zeer bijzondere waarneming. Niet alleen omdat deze vogelsoort zelden binnen ons werkgebied wordt waargenomen - Uit de laatste 10 jaar kennen we gegevens met betrekking tot 1 exemplaar bij de Beekloop ter hoogte van de Pastoorsweyer in Bergeyk, en van een mogelijke Kwak bij het Goorven -, maar ook omdat de Kwak in Nederland een Zomervogel is.

Henk Munsters.

ERVARING MET BLAUWE KIEKENDIEF CONTRA KLAPEKSTER.

Op 27-01-'85 was ik aan het wandelen op de Strabrechtse heide, in de buurt van de Hubertusbossen. In een dode boom ontdekte ik een Klappekster.

Wat later zag ik op enige afstand een Stootvogel op deze Klappekster afkomen. Het bleek een mannetje Blauwe Kiekendief te zijn. Het was prachtig om dit gebeuren te aanschouwen; De Klappekster zag het gevaar naderen en verdween meteen in het struikgewas. De Blauwe Kiekendief vervolgde zonder succes zijn weg.....

Henk Munsters.

LAATSTE OPROEP MET BETREKKING TOT KRUISBEKKEN.

Ik had de hoop al opgegeven. Ik verwachtte geen respons meer op mijn, tot in de treuren herhaalde, oproep, terwijl ik wist dat er nog vele waarnemingen van Kruisbekken binnen de gelederen van onze V.W.G. rondslingerden. En toch ga ik hier als een oude goedgezak opnieuw zeuren. Aanleiding is een brief van Rob Bijlsma. Rob is druk bezig met het verzamelen van broedgegevens van 1984 uit geheel Nederland. De Kruisbek broedde na de invasie van 1983 zoals verwacht in zeer groot aantal in het Midden van ons land. Het meest bijzondere was echter dat de vogels veel later dan normaal met broeden begonnen. Dit had zeer negatieve gevolgen voor het broedsucces, omdat de vogels pas jongen hadden toen een groot deel van het Dennen-zaad reeds gevallen was.

Stuur zo snel mogelijk alle waarnemingen uit 1983 en 1984 naar ondergetekende en omschrijf mogelijke broedgevallen zo gedetailleerd mogelijk. Laatste kans.....

Lex. (Mariaalaan 26, 5541 cd REUSEL).