

VOGELS IN DE STAD

WILLEM VEENHUIZEN

ALGEMEEN;

De oppervlakte van de wijk bedraagt c.a. 53 hectare, Ongeveer 11 ha. hiervan bestaat uit aaneengesloten groengebieden (groenstroken, parkjes, overhoeken e.d.).


In de jaren '82 en '83 heb ik dit stadsdeel eens geïnventariseerd om alvast wat ervaring op te doen in het karteren van vogels in het stedelijke gebied.

De wijk Geestenberg en Muschberg zijn gelegen in het oostelijk gedeelte van Eindhoven, tussen de spoorlijnen naar Weert en Venlo. Het is een nog vrij jonge wijk, de eerste bouwactiviteiten dateren van begin 1970.

Nabij het wijkcentrum is een parkachtige groeizone aangelegd (zie situatie-weergave) die voor 70 % uit golvende gazons bestaat, waarin gesitueerd afwisselende, verspreide bosquets van een gevarieerde inheemse beplanting.

Langs de zuidelijke spoorbaan zijn ruige bermen, met wilgenbosjes een belangrijk biotoop voor vele vogelsoorten.

Oude zware bomen/boomgroepen zijn in deze wijk niet aanwezig. In het Noord-oosten van de wijk Geestenberg is een industriewijkje van "rustige schone" gelegen.




SITUATIE VAN DE WIJK
GEESTENBERG - MUSCHBERG

Ik heb geïnventariseerd volgens de karteringsmethode, d.w.z. het intekenen van zingende mannetjes, of andere waarnemingen die duiden op territoriumgedrag of broeden.

Inventarisatiedata 1982		1983	
7 maart	8.30-10.00 uur	3 april	9.00-10.30 uur
8 -	8.00-9.00 -	1 mei	7.00-10.00 -
27 -	10.30-12.00 -	16 -	20.30-21.30 -
12 april	losse waarnem.	12 juni	8.30- 9.15 -
9 mei	20.30-21.45		
25 -	21.00-22.00 -		
31 -	5.45-7.45 -		
Totaal 7 bezoeken ± 9 uur		4 bezoeken = 6½ uur	

schematisch situatie-weergave:



Lijst van zekere en mogelijke territoria.		
	1982	1983
Houtduif	1 ?	?
Turkse tortel	8	6
Gierzwaluw	4 ?	4 ?
Kuifleeuwerik	1	1
Boerenzwaluw	1 ?	1 ?
Winterkoning	2+1 ?	2+1 ?
Heggemus	16-21	9-11
Zwartewoodstaart	1	-
Merel *	± 47	± 26
Zanglijster	-	1
Grote lijster	1	-
Spotvogel	2 ?	-
Tjiftjaf	-	1+1 ?
Fitis	-	1+1 ?
Staartmees	1	1+1 ?
Pimpelmees	1+1 ?	3+1 ?
Koolmees	3+2 ?	3
Ekster	3	2+1 ?
Kauw	?	1+?
Spreeuw	aarw.	aarw.
Huismus	aarw.	aarw.
Vink	4 ?	1 ?
Groenling	1 ?	1 ?
12 zekere terr. soorten		15 zekere terr. soorten
8 mogelijke " "		5 mogelijke " "
20 soorten		20 soorten

* Alleen de aanwezige ♂♂ zijn geteld, zijn ± de aanwezige territoria.

Hiernaast een lijst van zekere en mogelijke territoria

Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we nog weinig concluderen.

We zien wel dat de Merel, Heggemus en de Turkse Tortel de meest algemene soorten zijn, (Huismus is plaatselijk talrijk, voornamelijk in de oudere gedeeltes,

Het plots verschijnen van Fitis en Tjiftjaf is wel opvallend.

De daling van de Heggemus in '83 is veroorzaakt door de wat late start van de inventarisatie (geen bezoeken in maart)

Zangwaarnemingen overige soorten

	1982	1983
Roodborst	1 zwjn.	2 zwjn
Grasmus	1 -	2 - op spoordraden
Zwartkop	2 -	-
Tuinfluitier	1 -	1 -
Braamsluiper	3 -	2 -
Spotvogel	? -	1 -
Zwarte kraai	1 -	-
Graspieper	1 -MED;P.B.	-


Zijn een- of tweemaalige waarneming die niet gekwalificeerd kunnen worden

De Braamsluiper is misschien nog een mogelijke broedvogel voor beide jaren.

Huismus, Spreeuw en Merel zijn niet goed onderzocht.

De kleine aantallen territoria van 1983 zijn volgens mij te wijten aan de te weinige bezoeken, doch we krijgen een redelijk beeld van de aanwezige vogelwereld in een stukje stad.

Een start voor de stadsinventarisatie (stadsomithologie) is gemaakt. Dit was nog maar een klein stukje Eindhoven, straks meer



E.v. Asselpoek 83
m. Gezwet.