

Evenals vorig jaar kunnen we spreken van een zeer geslaagd broedseizoen voor diverse minder algemene soorten binnen het Goor & Flaes-reservaat.

14 Paar Geoorde futen kwamen tot broeden, tegenover 15 in 1983. Het lag niet binnen de verwachtingen dat de invasie van vorig jaar gevolgen zou hebben. In heel Nederland was deze tendens echter merkbaar. De broedresultaten lagen hoger als vorig jaar, maar juiste cijfers zijn nog niet bekend.

Sedert begin zestiger jaren heeft nooit meer een broedgeval van de Fuut plaatsgevonden binnen het reservaat. Als voornaamste oorzaak moet daarvoor waarschijnlijk een tekort aan voedsel aangemerkt worden. In 1981 constateerde A.v.Poppel een mislukte broedpoging bij de Flaes. Dit herhaalde zich in 1983 (L.Peeters). Nu, in 1984 vond een broedpoging plaats bij het Goorven. Verder dan een nest (met of zonder inhoud) kwam dit paartje helaas niet. Op de Flaes bevond zich al het gehele seizoen een broedverdacht koppel.

Op 18-06 bleken beide ex. een vrij groot jong op de rug mee te dragen. Na c.a. 25 jaar is de Fuut hier dus eindelijk weer broedvogel en hopelijk voor langere tijd....

Van 07-04 tot/met 19-04 bevond zich in de rietkraag van de Flaes een Roerdomp. Dit ex. riep echter ook overdag zo fanatiek dat het waarschijnlijk een ongepaard mannetje betrof. Toch geeft dit gegeven de hoop dat deze zeldzame reiger, die reeds sinds 15 jaar als broedvogel uit het reservaat verdwenen is, het gebied weer als geschikt broedbiotoop erkent, om in de toekomst weer een broedpoging te ondernemen.

Op 18-06 waren tenminste 7 paartjes Bergeend aanwezig! Helaas kon door allerlei onvoorziene omstandigheden het gebied nadien zelden bezocht worden tot in augustus. Hierdoor ontbreken geschikte gegevens om een indruk te verkrijgen van het aantal succesvolle broedgevallen. Van zeker 3 paartjes zijn in ieder geval juv. gezien. Dit houdt al weer een toename in voor deze soort die zich nog maar pas hier gevestigd heeft. Aanvullende waarnemingen zijn overigens zeer gewenst.

Meerdere controles van de Kokmeeuwenkolonies leverde dit jaar 1 paartje Zwartkopmeeuwen op. Gezien het gedrag van de vogels heeft zeker een broedpoging plaatsgevonden, al dan niet geslaagd. Juv. zijn niet gezien!

Uit een Havikshorst tenslotte, vlogen ter plaatse 3 jongen uit.

Lex.

1984, GESLAAGD BROEDSEIZOEN VOOR DE LANDSCHOTSE HEIDE.

Een nat voorjaar komt de ornithologische waarde van de Landschotse heide zeer ten goede, zo bleek het vorig en dit jaar. Zonder dat andere belangrijke broedvogels als Korhoen en Wulp er merkbaar nadelige gevolgen van ondervonden (het reliëfachtige karakter van de heide staat in voor blijvende droge delen) konden goede resultaten geboekt worden voor Zwarte stern en Tureluur.

De Zwarte stern was reeds vanaf het einde van de zeventiger jaren als broedvogel verdwenen, maar vestigde zich vorig jaar opnieuw! 2 geslaagd en 1 mislukt broedgeval bij het Withollandsvan waren het resultaat. Dit jaar was er weer sprake van kolonievorming op deze plaats. 7 paartjes maakten hiervan deel uit.

De Tureluur, die al jaren achtereenvolgend met een stabiele populatie van 3-4 paartjes vertegenwoordigd was, broedde in 1983 met tenminste 5 paar en dit jaar werden liefst 8 broedplaatsen gelokaliseerd.

Misschien toch wel aanleiding om de waterhuishouding van de Landschotse heide eens uitgebreid ter discussie te stellen!

Diverse waarnemingen van een overdag jagende Bosuil boven de heide tijdens het broedseizoen wijzen, gezien het beperkte jachtterritorium van deze Uil in de richting van een mogelijk broedgeval! Temeer daar ook van enkele andere jaren aanwijzingen in die trant bekend zijn, moeten we deze mogelijkheid serieus nemen. De soort heeft nog nooit op de lijst van broedvogels van de Landschotse heide vermeld gestaan. Bezoeken in de balstijd zijn hier voor 1985 zeer gewenst.

Lex.