

Vogelvaria.

Indrukwekkende aantallen van enkele onopvallende soorten.

Over sommige vogelsoorten is ons relatief erg weinig bekend. Hetzij omdat de vogel een onopvallend uiterlijk of geluid heeft, hetzij omdat de vogel een teruggetrokken leven leidt.

Zo beschikken we in ons waarnemingenarchief wel over cijfers m.b.t. Watersnippen, maar tevens zijn we er ons van bewust dat het in de meeste gevallen minimum-aantallen betreft, die vaak sterk afwijken van de werkelijkheid.

Watersnippen verblijven veelal in de oeverbegroeiing, zijn daardoor moeilijk te ontdekken en te tellen en hebben bovendien de eigenschap bij verstoring het opvliegen zo lang mogelijk uit te stellen.

Twee keer was ik dit jaar in de gelegenheid om een indruk te krijgen van reële aantallen, en wel op 24-08 en 24-10, telkens bij het Kromven op de Landschotse heide.

De eerste keer was een kerel, die naar zijn zeggen op zoek was naar eventuele botulismeslachtoffers, de oorzaak van een grote verstoring waarbij waarschijnlijk elke aanwezige Watersnip het luchtruim verkoos. Resultaat; liefst 145 ex.

Op 04-10 was een vrouw zo vrij haar twee honden (als ik ze goed gedetermineerd heb een "Herder" en een "Boef") het Kromven op stelten te laten zetten. Dit resulteerde in veel opvliegende Eenden, Kieviten, 1 Kleine Strandloper en 215 Watersnippen. Vermeld dient nog te worden dat de Landschotse heide nog 4 vennen meer telt, die ten zeerste in aanmerking komen als verblijfplaats van Snippen, maar die na de verstoringen bij het Kromven niet meer controleerbaar waren!

Een soort waarvan eveneens niet bijzonder veel bekend is, is de Graspieper.

Behalve enkele doortrek-waarnemingen beschikken we over de wetenschap dat vooral op heidegebieden soms flinke slaapplaatsen kunnen voorkomen, zeker in het winterhalfjaar. Bovendien leveren de ppd/SOBVWG-tellingen nu gegevens op omtrent het voorkomen van de soort als broedvogel in de Kempen.

Hoe hoog de aantallen op slaapplaatsen in de trekperiode kunnen oplopen wordt aardig geïllustreerd door de volgende waarnemingen;

21-09 en 04-10-'83; resp. 400 en 200 ex., bijeen op de Cartierheide (M. Ba.)
26-09-'83 ; 235 ex. in aardappelakker, De Bus (Reusel/Bladel) (L.Pe.)

In beide gevallen was in eerste instantie weinig van de aanwezige Piepers te merken, maar leverde verstoring de vermelde aantallen op.

In september was er bovendien sterke trek;

v.b.; 27-09-'83; 74 ex. (in 3 uur tijd) Reuselse Moeren (L.Pe.)

Tenslotte is vermeldenswaardig dat de Kneuen- en Rietgorzentrek soms ongewoon sterk is, dit najaar. Van elk een duidelijk voorbeeld;

KNEU; 04-10 300 ex. (in 1½ uur tijd) overtrekkend Cartierheide (M. Ba.)
RIETGORS; 27-09 91 ex. (in 3 uur tijd) " " Reuselse Moeren (L.Pe.)

M.Ba.; Marco Bakermans.

L.Pe.; Lex Peeters.

Lex.

Zwarte Kraai als nestkastbewoner.

Toen ik op 23 mei dit jaar een van mijn Steenuilkasten (Pijpmodel) ging controleren, bleek hierin een Kauw zijn nest te hebben. Dit is echter niet verwonderlijk, gezien het feit een holebroeder is.

Wat me echter wel verwonderde waren 3 jonge Zwarte Kraaien in een wat groot uitgevallen Torenvalkenkast, die wat verderop hing.

Geert Sanders.

Noot v/d. Red; Om in een nestkast te broeden hoeft een vogel geen holebroeder te zijn (en zeker niet in een halfopen kast waarin inderdaad vooral Torenvalk, maar ook Ransuil broeden)

