

## Vogelvaria.

### Mogelijke V.W.G.-activiteiten 1984.

Het is de bedoeling dat Vogelwerkgroep de Kempen buiten de medewerking aan het ppd-project ook eigen activiteiten ontplooid. Dat dit niet beperkt moet blijven tot een aantal kampjes, excursies en kempentochtjes ligt voor de hand. Met de jaarplanning in het vooruitzicht, waarmee het bestuur reeds in december zal beginnen, wil ik enkele voorstellen opperen.

Ten eerste een eventuele bekendtelling in de trekperiode. Een belangrijke vraag die hierom schreeuwt is o.a. "Welk belang heeft het bekenstelsel voor de opvang van Steltlopers?" Dat het antwoord hierop erg indrukwekkend kan zijn (uiteraard sterk afhankelijk van de waterstand) blijkt al uit enkele gegevens uit mijn logboek; In 1977 telde ik ruim een week lang, dagelijks een traject van max. 300 meter van "De Reusel" bij Hooge Mierde. De waterstand was behoorlijk laag!


	20-07	21-07	22-07	23-07	24-07	25-07	26-07	27-07
Oeverloper	3	2	-	-	-	-	-	1
Witgatje	14	16	7	9	6	6	12	5
Watersnip	4	1	-	1	-	-	1	-
Groenpootruiter	5	4	2	1	1	-	3	2
Blauwe reiger	3	6	-	-	-	-	-	1

De fluctuaties van de aantallen van dag op dag zijn waarschijnlijk aanwijzingen voor doortrek. Dit houdt in dat een eventuele bekendtelling in voor en -najaar binnen zeer kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd om vergelijkbare gegevens te verkrijgen. Vermeldenswaardig is bovendien dat de Witgatjes die overdag verspreid zaten over het beektraject tegen de avond bijeen kwamen op een gemeenschappelijke slaappleats in de vorm van een slikrijk afwateringsslootje.

Het tweede voorstel is een telling in de trant van de "wintertelling" zoals we die nu kennen uit te voeren in voor- en/of najaar. Zo'n proeftelling door onze Werkgroep levert belangrijke gegevens op over het agrarische gebied als opvang/fourageer- en pleistergebied van doortrekkers en tevens is de opgedane ervaring van belang indien een soortgelijke telling door de ppd of het SOBWWG in het groot mochten worden opgezet. Hier alvast op vooruit lopend heb ik enkele proeftellinkjes gehouden om een indruk te krijgen van de te verwachten resultaten en eventuele problemen.

Mogelijke problemen die aan het licht kwamen zijn;

- De tellingen moeten i.t.t. de wintertelling, binnen kort tijdsbestek worden uitgevoerd, willen de resultaten vergelijkbaar zijn. Het vogelbestand is in het voor- en najaar immers minder stabiel en plaatsgebonden als in de winter. In enkele dagen tijd kunnen grote trekverschuivingen plaats vinden (denk aan een soort als Grutto die binnen enkele dagen verdwenen kan zijn). In kort termijn kunnen vogels zich ook over een groot aantal kilometers verplaatsen of verspreiden (denk b.v. aan Kieviten die regelmatig "Ver-vliegen" en zich weer aansluiten bij andere groepen).
- Er moet terdege rekening gehouden worden met de akkerbegroeiing. Graan en Mais belemmeren in deze tijd van het jaar sterk de overzichtelijkheid van het terrein.
- Sommige soorten die in deze tijd voorkomen en interessant zijn om te tellen, zoals Roodborsttapuit, Paapje en Tapuit, bevinden zich vaak in maisakkers. Willen we dezen meepikken, dan zullen we met relatieve aantallen moeten gaan werken die betrekking hebben op ex. in het open veld.



Vogelvaria.

Vervolg "Mogelijke V.W.G.-activiteiten 1984".

Een leuke bijkomstigheid bij zo'n telling in de trekperiode is uiteraard dat je soms voor leuke verrassingen kunt komen te staan.

De resultaten van de 3 proeftellinkjes waren als volgt;

— 14-07-'83; 600 h.a. geteld, omgeving Bladel-Netersel.

— 01 +02-08-'82; 800 h.a. geteld, omgeving de Bus en Het Beleven. Reusel/Bladel.

— 29-09-'82; 600 h.a. geteld, omgeving Hooge Mierde.

Je ziet, de gebieden waren telkens anderen, het heeft dus geen zin onderling te gaan vergelijken, daar zijn het landschap en de oppervlakte te verschillend voor. De bedoeling is dan ook, slechts een indruk te geven van de te verwachten verscheidenheid aan eventueel te tellen soorten en de aantallen waarmee zij vertegenwoordigd kunnen zijn;

	14-07-'83	01+02-08-'82	29-09-'82
Blauwe reiger	-	3	-
Waterhoen	-	2	-
Patrijs	-	14	-
Fazant	-	3	-
Kievit	595	1100	556
Grutto	12	-	-
Wulp	165*	4	6
Regenwulp	-	geh.	-
Scholekster	4	1	-
Kokmeeuw	155	57	70
Torenavalk	1	2	1
Sperwer	1	1	-
Buizerd	-	-	3
Holenduif	5	23	62
Houtduif	26	34	137
Tortelduif	22	11	-
Turkse Tortel	9	10	1
Vlaamse Gaai	-	-	4
Kauw	428	797	98
Zwarte Kraai	38	77	21
Ekster	69	37	15
Grote Lijster	9	67	12
Kramsvogel	-	1	-
Tapuit	-	-	4
Roodborsttapuit	-	4	1
Paapje	-	-	1
Witte Kwikstaart	12	7	3
Gele Kwikstaart	2	-	-
Graspieper	16	12	3

Vogelvaria.

Vervolg "Mogelijke V.W.G.-activiteiten 1984".

\* Van de 165 Wulpen bevonden zich er 155 in de vaste pleistergebieden bij de Mispelleindse heide.

De Geelgors was vertegenwoordigd met resp. 3, 21 en 4 ex.

Lex.

LEPELAAR; eerste waarneming voor de Kempen.

Op 07-08-'83 bevonden Hein Prinsen, Kees Goudsmit en ondergetekende zich aan het Kromven, op de Landschotse heide. Op een gegeven moment kwam een Lepelaar aanvliegen. Na wat ronjes te hebben gevlogen ging hij zitten. Aan de zwarte vleugelpunten en roze snavel was te zien dat het een juveniel betrof. Rustig begon de vogel zich te poetsen. Na een minuut of tien echter, werd de vogel opgejaagd door een Bruine Kiekendief, waarna hij niet meer terugkeerde. Het betreft de eerste waarneming van een Lepelaar in de Kempen!

Jeroen Cornelissen.

