

Vogelvaria.

Huiszwaluwen broedend op gitzwarte achtergrond.

Er wordt wel eens beweerd dat Huiszwaluwen een voorkeur hebben voor een witte ondergrond om hun nesten tegen te bevestigen; En dit zou samen kunnen hangen met het feit dat wit warmte-afstotend is en meer licht in het nest brengt.; En inderdaad blijken de meeste bouwwerkjes gemetseld tegen witte balken. Maar uitzonderingen bevestigen de regel.....

Aan de enorme zilverzandwinning te Dessel staan, eveneens enorme, gitzwarte metalen silo's in de open lucht, midden in de eventuele zonnehitte. Onder de overhangende rand, bovenop de silo's hebben een groot aantal Huiszwaluwen hun nest.

Terzijde; In de oever van de afgraving broeden zo'n honderd paren Oeverzwaluwen (110 hollen die voor een erg groot percentage bezet zijn!).

Lex.

Grote concentratie Blauwe Reigers aan de Keyenhurk.

Tijdens de zomer van 1982 nam ik op de Keyenhurk zeer veel pleisterende, veelal fouragerende Blauwe Reigers waar, Ook Kievitte en grote aantallen Kokmeeuwen vertoefden aan het ven dat langzaam maar zeker uitdroogde. Hier volgen ter illustratie enkele waarnemingen;

Datum;	Bl.Reiger;	Kievit;	Kokmeeuw;
06-08*	23	5500	?
12-08	42	1800	?
30-08	36	100-den	100-den
02-09	63	1600	290
03-09	15	2400	60
05-09	31	4/5000	250
10-09	72	3000	60
11-09	94	?	?
15-09	83	?	?
18-09*	61	1500	?
21-09*	31	640	1300
25-09	-Ven voor merendeel uitgedroogd, vogels waren sterk in aantal verminderd!		
29-09*	4	400	660

*aanvullende waarnemingen van Lex.

Hetgene wat ik me nu afvroeg was, wat een zo groot aantal Reigers hier te zoeken had. Als je kijkt naar de cijfers hebben er gemiddeld een maand lang elke dag 50 Bl. Reigers gezeten, en gegeten. Volgens mij is daar een grote vracht voer voor nodig.

Toch denk ik nu te weten waar die Blauwe Reigers van geleefd hebben; In het voorjaar 1983 hebben Pieter Wouters en ik het vennetje ten oosten van de Keyenhurk eens nader onderzocht. Daar vingen we in zeer korte tijd zo'n 40 Amerikaanse Hondsvissen. Aan gezien deze vis in vrij zuur water (En de Keyenhurk is zuur) kan leven, vermoed ik dat de Keyenhurk boordevol met Amerikaanse Hondsvissen heeft gezeten.

Geert Sanders.

N.a.v. bovenstaande;

In elk droog jaar kun je dit verschijnsel constateren. Vooral in visrijke plassen en vennen die dan uitdrogen wordt de hoeveelheid geschikt voedsel voor Reigers per eenheid water relatief groter en dit oefent uiteraard een enorme aantrekkingskracht op deze soort uit. Behalve Hondsvissen kan er op de Keyenhurk ook best paling zitten. In het droge 1976 zag ik aan de Vlaes meerdere malen deze vissoort aan Blauwe Reigers ten prooi vallen. Behalve vis worden vooral op zure, visarme of visloze plekken ook veel waterinsekten gegeten. Braakballen onder een slaapplek van Blauwe Reigers bij de Vlaes bleken behalve wat botjes en Muizeharen uitsluitend Geelgerande Kever-schilden te bevatten!

Lex.