

R. W. W. W. 7(4) 1981

RANU

### VLAAMSE GAAI ALS NESTLASTBEWONER!!

Vorig jaar ('80) bleek een grote kast in de Reuselse Moeren, eigenlijk bedoelt voor Uilen bewoond te zijn door een Vlaamse Gaai. Het nest bevatte al jongen. Tot zover ons bekend is het niet bepaald een gewoonte van deze soort, gebruik te maken van nestkasten.  
(meded. W.v'd. Voort).

### RANSUILEN SLACHTOFFER VAN BOUWKUNST VORIGE NESTBEWONERS.

L. Peeters & W.v.d. Voort

Op 01-06-'80 werden ten westen van de visvijver te Bladel in een oud Kraaiennest 2 vliegvlugge Ransuilen dood aangetroffen. Beide ex. bleken verstrikt geraakt te zijn in wat touw dat verwerkt was in het nest, wat hun het verlaten van hun geboorteplaats verhinderde. Van de situatie zijn dia's gemaakt. Typisch was overigens dat deze Ransuilbroedplaats op slechts 50 m. afstand gevestigd was van een door Steenuilen bezette nestkast.  
(Lex, Wim)

### HOLENBROEDERS DE DUPE VAN KORTZICHTIGHEID JAGERS.

Via mondelinge mededelingen van de opzichter van landgoed "Ten Vorsel" te Bladel is vernomen dat dit jaar vele holen van oude bomen in dit prachtige bosgebied door jagers met plastic zijn afgesloten. Hun rede hiervoor is naar alle waarschijnlijkheid geweest de in hun ogen schadelijke vogels als Spreeuwen en Kouwen te bestrijden. Daar deze activiteit in de broedtijd plaats vond zijn diverse broedgevallen, ondermeer die van 2 Zwarte Spechten mislukt.  
(meded. Marco B.)

### HONKVASTE KERKUIL

Dit jaar werd een reeds jarenlang bezette broedplaats van een Kerkuil in een oud sigarenfabriek te Hapert verwoest door een brand. Verschillende maanden later werd Marco B. er door iemand op attent gemaakt dat een van de Uilen zich nog steeds in het pand bevond. Bij controle werd de vogel die in goede conditie bleek te zijn op klaarlichte dag aangetroffen op een stapel kisten. Dit terwijl men op kleine afstand van hem vollop aan het werken was.  
(meded. Marco B.)

### KRAAIEN STEEDS BRUTALER?

Op 19-05-'81 fietste ik met Wim van de Voort naar de Reuselse Moeren. Boven de weiden ten Oosten van dit terrein merkten we 2 Zwarte Kraaien op, hoog in de lucht, fel achter een klein zangvogeltje aan vliegend. Op een gegeven ogenblik lukte het hen het slachtoffer (vermoedelijk 'n Graspieper) tot vlak boven de grond te krijgen en hem hier zelfs te grijpen. Na een kort gevecht met twee soortgenoten ging één van de Kraaien met de prooi in zijn bek er vandoor.

Even later vonden we in de Moeren weer diverse Eenden- en Duiveneieren, en zelfs een ver bebroed Ransuilenei, allen duidelijk door Kraaien aangepikt. Ondanks het feit dat we ook voorgaande jaren veel geroofde eieren vonden waaronder in 1980 een van een Waterral, hebben we in onze inventarisatie-verslagen gericht aan S.B.B. steeds gevraagd niet tot afschot van Zwarte Kraaien over te gaan. Hebben we hier echter nog wel te maken met een zuiver natuurlijke zaak, of kan de sterke toename van het aantal in de broedtijd pleisterende ex. van deze soort in de Moeren (nu al c.a. 55 ex. waaronder veel niet broedende vogels op 110 h.a.) beter gezien worden als een soort storingseffect????  
(Lex)