

DETERMINATIE VAN KROMBEK- EN BONTE STRANDLOPER

Henk Hendriks.

Inleiding

De Bonte Strandloper trekt in enorme aantallen in ons land door, voornamelijk langs de kust. Tevens overwintert de soort in grote groepen hier. (denk aan de waddenzee). De Krombekstrandloper daarentegen trekt in veel kleinere aantallen door en wordt ook meer in het binnenland gezien.

In ons werkgebied worden deze 2 soorten vrij weinig gezien. Alleen in droge zomers zoals in 1976, wanneer veel vennen bijna geheel droogvallen, wordt een gunstig biotoop voor steltlopers gecreeërd en zien we direct een toename van het aantal waarnemingen. Het komt in feite niet zo vaak voor dat je beide soorten in de Kempen in 1 kijkerbeeld hebt, en zeker niet in behoorlijke aantallen.

Een uitzondering hierop vormen de zandplaten bij de zinkfabriek in Budel-Dorplein, welke een grote aantrekkingskracht op steltlopers blijken te hebben. Praktisch alle in Nederland regelmatig voorkomende steltlopers (dus ook Krombek- en Bonte Strandloper) zijn hier het afgelopen jaar gezien.

B.v. op 13 september 1981 7 Bonte Str.lopers en 13 Krombekken. Op 19 september werden er zelfs 60(!) Bonte Strandlopers gezien wat waarschijnlijk wel het recordaantal is in ons gebied.

In ieder geval ben je in Budel-Dorplein in staat om op je gemak overeenkomsten en verschillen tussen beide soorten te zien.

De zogenaamde "kromme bek" van de Krombekstrandloper is een zeer slecht kenmerk aangezien de snavel van de Bonte Strandloper praktisch even lang is en ook vaak krom.

Het meest in het oog springende verschil is wel de opvallende witte stuit welke de Krombekstrandloper in vlucht toont. Verder maakt de Krombek een veel slankere, elegantere indruk dan de meer gedrongen, compacte Bonte Strandloper. Dat laatste kan overigens knap lastig te zien zijn wanneer je de vogels op een afstandje bekijkt en ze tot aan hun borst in het water waden.

Dan moet je op andere kenmerken afgaan.

Overzicht van de belangrijkste verschillen.

<u>Bonte strandloper</u>	<u>Krombekstrandloper</u>
Houding: gedrongen, met korte nek en poten.	Slanker, met langere poten.
vlucht: Witte staartzijden.	Toont opvallende witte stuit.
Borsttek: Gestreepte borst, met soms nog een vage zwarte buikvlek in de herfst.	Egale lichte borst met vaak een donkere waas.
Koptek: Onduidelijke wenkbrauwstreep.	Opvallende wenkbrauwstreep.
Geluid: 2-tonig "tsjirip"	1-tonig hoog en kort "trie"
Grootte (snavelpunt-staarteinde) is praktisch gelijk. N.l. 18-19 cm.	