

9 Nqts

B E F L I J S T E R S

Algemeen

Dit voorjaar werden er in de Kempen diverse Beflijsters gezien, waarschijnlijk méér dan in andere jaren. Hieronder de tot dusverre bekende waarnemingen:

3, 4 en 5 april 1981: m. + vr. Postels Huufke, Vessem (PvdHe)
 10 april : m. + vr. Strabrechtse Heide (HHe)
 14 april : m. overvliegend Keijenhurk (RAa en The)
 vr. Rouwven (RAa en The)
 20 april : m. zuidrand Oirschotse Heide (RAa)

(N.B. Op 2 mei zag ik nog 2 exx. duinen bij Scheveningen, FNe)

In West-Europa heeft de Beflijster een ietwat merkwaardig verspreidingsgebied: Skandinavië en Britse Eilanden (ssp. "torquatus") en de gebergten als: Pyreneeën, Alpen, Massif Central, Vogezen, Zwarte Woud e.d. (ssp. "alpestris"). Van deze ondersoort zijn de mannetjes duidelijk "geschubd" en hebben heel lichte vleugels.

In de Kempen worden Beflijsters vrijwel uitsluitend op de voorjaars-trek gezien en wel van eind maart tot in mei. Meestal betreft het enkelingen, soms 2 of 3 bij elkaar en de waarnemingen beperken zich tot een enkele per jaar.

Op de Waddeneilanden kan men in bijv. april soms grote aantallen zien. In april '75 zag ik op Terschelling vele 10-tallen Beflijsters, soms in groepjes van 10 of méér bijeen.

Ook in het najaar (vooral oktober) zie je aan de kust vaak Beflijsters, maar in de Kempen ontbreken waarnemingen uit deze periode nagenoeg geheel. Een mogelijke oorzaak daarvoor is misschien het voedselaanbod:

In het najaar voeden lijsterachtigen zich grotendeels met bessen. De kust, met zijn duinvalleien vol lijster-, vlier-, duindoorn- en andere bessen, vormt een tafeltje-dek-je voor de doortrekkende lijsters (en andere vogels natuurlijk).


Bij ons is dat voedsel veelal verspreid te vinden, minder gekoncentreerd. Zeker treffen we in de Kempen in de herfst talrijke Koperwieken en Kramsvogels op de besdragers aan, maar die aantallen vallen in het niet vergeleken met die aan de kust. De toch al vrij schaarse Beflijsters zie je dan eerder op de rijke plaatsen, waar je ook véél meer andere trekkende lijsters aantreft.

In het voorjaar voeden de lijsters zich uiteraard meer met dierlijk voedsel en dat is op allerlei plaatsen even rijkelijk voorhanden, zodat in dat jaargetijde de Beflijster meer verspreid over het land wordt waargenomen. Bovendien zijn ze (vooral Beflijsters) makkelijker te ontdekken op open terrein dan in de struiken!

Natuurlijk is dit slechts een veronderstelling en het verklaart toch niet helemaal het vrijwel ontbreken van deze soort in de herfst in de Kempen. Het zou interessant zijn te weten of dit ook in andere delen van het land is gekonstateerd.

De tot dusverre in ons land waargenomen Beflijsters behoorden allen tot de ondersoort "torquatus". Hoewel de Britse en de Skandinavische populaties niet van elkaar zijn te onderscheiden, is het aannemelijk dat de bij ons doortrekkende Beflijsters afkomstig zijn uit Skandinavië. Hierop wijzen de overigens vrij schaarse ringvondsten (Eric Simms, BRITISH THRUSHES, 1978).

In het laatste nummer van "Vogels" (voorheen "De Lepelaar") mei/juni 1981, staat een aardig artikel over Beflijsters van K.H.Voous.



Determinatie

Men kan Beflijsters alleen maar verwarren met Merels, vooral weg- of overvliegende vogels en wijfjes. Gedeeltelijk albinistische Merels kunnen voor verwarring zorgen, maar bij nauwkeurig waarnemen lette men op de onderstaande punten:

	<u>Beflijster</u>	<u>Merel</u>
Snavel:	m.: vuilgeel w.: donkerder	m.: oranje w.: donker (soms vuiloranje)
Lichaamskleur:	m.: grijszwart w.: grijsbruin	m.: roetswart w.: aardbruin
Vleugel:	m.: met lichte vlek w.: lichte vlek nóg opvallender	m.: afwezig w.: " (tenzij ged. albinisme)
Vlucht, silhouet:	nogal lijkend op Kramsvogel, met vrij lange staart.	proporties wat evenwichtiger, ty- pische vliegwijze.
Geluid:	scherp, afgebeten: "tek-tek-tek"	'n wat voller: "tjak-tjak-tjak"

Resumerend:

Een wegvliegende Beflijster (waarbij men de "bef" niet kan zien, of in het geval van wijfjes met 'n onopvallende bef) kan het gemakkelijkst herkend worden aan zijn manier van vliegen, silhouet, de lichte vlek op de vleugel en zijn geluid.

Frank N.