

11. august 7(3), 1981.

Roodp VA

H. Hendriks

Invasie van Roodpootvalken in de Kempen.

De indruk bestaat dat er momenteel een (bescheiden) invasie van Roodpootvalken plaatsvindt. Het is wel een normaal verschijnsel in het voorjaar dat er in de Kempen Roodpootvalken gezien worden. Meestal echter eind mei-begin juni. Bij mijn weten nog nooit zoveel als dit voorjaar.

Van 9 t/m. 17 mei zijn tenminste 8 verschillende exx. gezien. Aangezien de waarnemingen slechts door enkele mensen en maar op een paar van de voor Roodpootvalken geschikte plaatsen zijn gedaan, zou het mij niet verbazen als er nog veel meer exx. op de daarvoor geschikte terreinen zitten. (Malpie?) Wat zijn nu de geschikte gebieden voor deze valken.

Opvallend is dat ze bijna altijd daar gezien worden waar ook de Boomvalk behoorlijk aanwezig is.

Dat zijn dus open landschappen met verspreide bomen, bij ons dus de heidevelden.

Ik wil iedereen dan ook aanraden om elke Boomvalk die je ziet nog eens extra goed te bekijken, aangezien de Roodpootvalk kwa silhouet en vlucht nauwelijks van de Boomvalk is te onderscheiden. Frank N. en ik hebben de afgelopen dagen herhaaldelijk beide soorten samen zien vliegen (we wisten dus dat er een Roodpoot tussen zat) en kwamen beiden tot de conclusie dat de verschillen zeer miniem zijn.

Alleen wanneer je een "Boomvalk" ziet die even 1 à 2 sec. bidt, heb je geheid met een Roodpootvalk te maken.

Zo kon ik er op deze manier in juni '79 een Roodpootvalk tussen ong. 10 Boomvalken uithalen, waarmee hij s'avonds op de Strabrechtse Heide aan het jagen was. Gemakkelijker wordt het natuurlijk wanneer je duidelijk kleuren kunt onderscheiden.

Typisch voor een Roodpootvalk is ook dat hij weinig schuw is en zodoende vrij dicht benaderd kan worden. Hij blijft ook vaak lange tijd achtereen op 1 plaats zitten (veel langer als een Boomvalk), vaak op een kale wat uitstekende tak. Hierop keert hij iedere keer weer terug na korte jachtpartijtjes op insecten.

OPROEP:

I.v.m. een artikel over de Roodpootvalk behandelend determinatie, variatie in klee en voorkomen in Zuid-oost Brabant, wil ik iedereen verzoeken om waarnemingen van deze soort vanaf 1966 t/m. 1981 in te sturen.

Indien mogelijk, behalve vermelding van datum en plaats, een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van het verenkleed geven. Vooral tweede-jaars mann. zijn bijzonder variabel. Er zijn de afgelopen tenminste 3 verschillende kleeden gezien van tweede-jaars mann. En deze zijn lang niet allemaal goed in de literatuur terug te vinden.

Waarnemingen graag op sturen naar;

Henk Hendriks.

Groesstraat 5 Geldrop

Of iemand anders van de vogelwerkgroep.

BELANGRIJK: Werk aan de winkel.

Het schrijven van stukjes over b.v. Rode Wouw en Roodpootstaat of valt met de wel of niet verleende medewerking van vogelaars binnen en buiten de werkgroep. Verzamel daarom op een overzichtelijke manier waarnemingen over genoemde soorten uit je dagboeken en peuter gegevens los van andere "ongeorganiseerde" vogelaars en stuur ze op.

Z!O!Z!

OVERZICHT VAN DE WAARNEMINGEN ROODPOOTVALK VOORJAAR '81.

-Begin april 1 ex.destructor Son.Tom Heijnen.
Dit is een bijzonder vroege waarneming.

-9 mei, 2 tweede-jaars mann.Budel-Dorplein.F.Neijs
T.Heijnen.

-11 mei, 1 tweede-jaars mann.Strabrechtse Heide.
H. en J.Hendriks.

12 mei, 3 exx.(1 volw.mann, 1 vr. en tweede-jaars mann.)
Strabrechtse Heide.R.Bouwman, n.Bosmans.
Het tweede-jaars mann.had een ander kleed las het
ex.op 22 mei.

13 mei, tweede jaars mann.Strabrechtse Heide.Zelfde ex.
als op 12 mei.H!en J.Hendriks, T.Melters.

17 mei.tweede-jaars vr.Budel-Dorplein.F.Neijs, H.Hendriks.

18 mei tweede jaars-mann.Cartierheide.F.Neijs.
Weer een ander kleed als de 2 andere tweede-jaars
mann.

Groetjes en werk ze, zowel in het veld als thuis.

Henk.