

Verder zijn er van de laatste jaren geen waarnemingen bekend. Wel is het zo dat er net over de grens in de belgische Kempen wel waarnemingen van duikers gedaan zijn en wel op de grote afgravingen in de buurt van Mol.

In de winter van 1978/79 hebben zich wekenlang 2 Parelduikers op de grote afgraving Miremare bij Mol opgehouden. En in 1977 en 1980 (geen juiste data bekend) heeft zich op dezelfde plas een Roodkeelduiker bevonden.

Grote groep Eidereenden bij Budel-Dorpplein.

Op 6 december werd door Ad van Poppel tijdens een plassentelling 34 overvliegende Eidereenden bij Budel-Dorpplein waargenomen. Op dezelfde dag werd in de gehele Kempen ook massale verplaatsingen van Ganzen waargenomen. (zie elders in de Blauwe Klauwier). In tegenstelling echter tot de ganzen, waarvan de meeste in westelijke of noordelijke richting trokken, vlogen de Eidereenden in zuid-westelijke richting. Afgezien van het feit dat je toch al niet elke dag een Eidereend in de Kempen te zien krijgt (zie vorige Blauwe Klauwier), is een aantal van 34, dacht ik, toch wel uitzonderlijk.

Frater.

In december van het vorige jaar werd door Wim van Voort in de omgeving van Luycksgestel enkele keren Fraters waargenomen. 1 keer had hij 4 exx. fouragerend op een akker, op meldezaad. verder hoorde hij regelmatig groepjes overvliegen waarbij ze hun kenmerkende roepjes lieten horen. De Frater kan het gemakkelijkst verward worden met de Kneu wiens noordelijke tegenhanger hij is.

Verschillen tussen Kneu en Frater. (in de winter)

Frater (Carduelis flavirostris)

Kneu (Carduelis cannabina).

- | | |
|---|--|
| -donkerder en gestreepter bovenden. | -lichter en egaler bovenden. |
| -minder wit in vleugels, staart. | -meer wit in vleugels, staart. |
| -Snavel geel (grijs in zomer). | -Snavelkleur is zwartachtig. |
| -Kin en keel ongestreept isabeurkleurig. | -Kin en keel witachtig en gestreept. |
| -man heeft rozeachtige stuit. vr. heeft ongestr. beige stuit. Is in 't veld moeilijk te zien. | -man kan in de winter een rood/roze voorhoofd, borst hebben. |
| -roep: trager en scherper als Kneu. een nasaal, metalig "twiee". | -roep: klinkt als "tswieet". tsjilpende roep in vlucht. |

De Frater is broedvogel van open rotsige en heideachtige terreinen, gewoonlijk hoog in de bergen, maar in het hoge noord-westen tot op zeeniveau.

In Nederland is de Frater een weinig talrijke doortrekker en wintergast, vooral langs de kust en vaak samen op dezelfde terreinen en biotopen voorkomend met soorten als Strandleeuwierik en Sneeuwgorst. Soms kunnen ze ook in vrij grote groepen voorkomen. (50-100 exx.)

In de Kempen is de Frater een zeer schaarse wintergast met uitzondering van invasiejaren, zoals 1975 een was.